

112年10月 主要農作物生產預測

洪思賢¹ 徐慧玲¹ 林佩慧¹

果品類

香蕉收穫面積1萬4,590公頃，總產量33萬4,366公噸，較常年減產4%；秋冬蕉產量15萬755公噸，較111年減產10%。

香蕉主產區分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大產區，依採收季節可分為春夏蕉（2月下旬～9月中旬採收）及秋冬蕉（9月下旬～翌年2月上旬採收）。112年綜合各產區觀測結果，部分產區受黃葉病、人口老化等影響略有減少種植面積，部分產區因檳榔廢園後轉作香蕉，面積略有增加，整體面積變動幅度不大。112年秋冬蕉受颱風影響，南部及東部產區有葉片破裂、植株折斷倒伏情況，評估全年產量較上



年及常年減少。預估112年收穫面積1萬4,590公頃，與111年1萬4,616公頃相當，較常年平均1萬4,975公頃，則減少3%；產量33萬4,366公噸，較111年35萬1,480公噸減產5%，與常年平均35萬116公噸，亦減產4%。112年秋冬蕉預估收穫面積為7,223公頃，較111年7,316公頃減少1%；產量15萬755公噸，較111年16萬6,635公噸，則減產10%。

番石榴收穫面積7,854公頃，總產量19萬641公噸，較常年增產2%；下半年果產量10萬1,832公噸，較111年減產3%。

番石榴為熱帶常綠果樹，周年可開花結實，主產區分布於高雄、臺南及彰化等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1～

註1：農業部農糧署。



6月)及下半年果(7~12月)。番石榴運用不同修剪時期調節生產，以配合市場需求，並可避開6~9月水果盛產期及颱風豪雨季節。番石榴技術門檻較低，收穫面積近5年有增加趨勢；產量除107、108、110、111年受豪雨、水災、乾旱、靈雨等影響外，本年南部產區則有颱風造成下半年果落果，評估全年產量較上年再有減少。預估112年收穫面積7,854公頃，較111年7,907公頃略減1%，較常年7,602公頃，則增加3%；產量19萬641公噸，較111年19萬7,399公噸減產3%，較常年18萬7,130公


噸，則增產2%。下半年果預估收穫面積7,854公頃，較111年7,907公頃略減1%；產量10萬1,832公噸，較111年10萬4,518公噸減產3%。

木瓜收穫面積2,608公頃，產量12萬6,605公噸，較常年增產1%；冬果產量5萬39公噸，較111年減產3%。

木瓜為熱帶果樹，主產區為屏東、臺南及南投等縣市，品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可藉由人為疏花疏果進行產期調節，適當調節果實於價高或病害較少

的季節產出，
因此全年可採
收，依採收季節可
分為夏果（3～8月）
及冬果（9月～翌
年2月）。112年
各產區收穫面積
變動不大，部分產

區產量受7～9月接連3個颱風影響，
相較107、108、110年有水災、豪
雨，111年亦有5～6月降雨，評估全
年產量仍較上年再減產。112預估收
穫面積2,608公頃，與111年2,602
公頃相當，較常年2,639公頃，則
略減1%；產量12萬6,605公噸，較



111年12萬8,343公噸減產1%，較
常年12萬5,953公噸，則增產1%。
冬果預估收穫面積2,608公頃，與
111年2,602公頃相當；產量5萬39
公噸，較111年5萬1,633公噸，則
減產3%。

**柳橙收穫面積4,747公頃，產量12萬
7,605公噸，較常年減產7%。**

柳橙為亞熱帶常綠果樹，主產區
為臺南、雲林、嘉義及南投等縣市，
主要產期為10月～翌年2月。柳橙
樹勢強健，對環境抗性強，具一年可
生長3～4次梢之特性，早期栽培面





積快速增加，生產過剩，近年已逐步達產銷平衡，並持續宣導配合生長發育時期合理化管理水分、肥培及病蟲害，以維持良好產量及果實品質。產量部分，南部產區中小果期受9月上旬豪雨影響，中部產區開花著果情形佳，評估產量與上年變動不大。預估112年收穫面積4,747公頃，較上年4,826公頃減少2%，較常年4,973公頃減少5%；產量12萬7,605公噸，較上年12萬6,249公噸增產1%，較常年13萬6,604公噸，則減產7%。

桶柑收穫面積2,925公頃，產量5萬3,064公噸，較常年增產1%。

桶柑為甜橙及寬皮柑之天然雜交種，栽培品系以普通桶柑、大春種桶柑及由桶柑變異之海梨柑最多。主產區為新竹、苗栗、臺中等地淺山丘陵地帶，主要產期為1～2月。桶柑有隔年結果現象，透過適當的修剪及肥培管理，可減緩此現象。112年部分產區因人口老化致廢耕面積增加，收

穫面積較上年略減；產量部分，相較111年西部地區主產縣市開花著果期間受降雨影響，東部地區受7～8月乾旱影響落果，本年多數產區生育狀況良好，總產量將恢復常年水準。預估112年收穫面積2,925公頃，較111年2,960公頃略減1%，較常年3,051公頃減少4%；產量5萬3,064公噸，較111年4萬7,110公噸增產13%，較常年5萬2,300公噸，亦增產1%。

葡萄（冬果）收穫面積2,196公頃，產量1萬8,981公噸，較常年減產30%。

葡萄為多年生溫帶果樹，主產區為彰化、苗栗、臺中及南投。葡萄產期調節技術發達，最普遍的栽培模式為6～7月生產夏果及12月～翌年1月生產冬果之一年二收模式，另有利用溫室設施栽培生產3～5月早春葡萄或僅收夏果等一年一收栽培模式，葡萄（夏果）預測包含早春葡萄或夏果，葡萄（冬果）預測則僅包含冬果。臺灣葡萄栽培品種以鮮食葡萄巨峰為主，與進口葡萄具區隔性，惟葡萄雖具高經濟價值，因栽培技術門檻高，耗費勞力且近年常因氣候致催芽期授粉不良等情形，農民有廢園及轉種其他作物之趨勢，收穫面積逐漸減少；產量部分，112年考量部分產區耕作模式由一年二收之模式逐步調整為僅收早春葡萄或僅收夏果之一年一收模式，又部分產區本年冬果受9月



上旬豪雨影響落果，評估本年冬果產量減少。預估112年收穫面積2,196公頃，較111年2,244公頃減少2%，較常年2,395公頃減少8%；產量1萬8,981公噸，較111年2萬1,887公噸減產13%，較常年2萬6,984公噸，則減產30%，係因彰化地區109年將早春葡萄歸類於冬果，後經重新盤點調整早春葡萄改列於夏果面積及產量所致。

紅龍果收穫面積2,602公頃，產量6萬3,613公噸，較常年減少5%。

紅龍果為多年生草本植物，主產區分布於彰化、南投、臺南及屏東等

縣市，主要產期為6～10月。利用夜間燈照技術，部分產區可提早採收期至5月或延長至翌年3月，亦可調控留花留果數，提高果實重量及品質。紅龍果約自100年起種植面積逐年大幅成長，自106年起市場價格逐漸平緩，種植面積始大致持平，近年則有部分農友轉作其他作物或廢園情形。本年部分產區受上半年乾旱及近期颱風影響開花、著果，單位產量較上年減少。預估112年收穫面積2,602公頃，較111年2,659公頃減少2%，較常年2,768公頃減少6%；產量6萬3,613公噸，較上年6萬4,976公噸減產2%，較常年6萬7,239公噸，亦減產5%。

蔬菜類

一、葉菜類

甘藍收穫面積432公頃，產量2萬3,853公噸，較上月增產8%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。秋季為高冷地產區與平地產區生產交替期，宜蘭、臺中及南投等高冷地產區持續採收，目前為二期作採收期；彰化及雲林等平地產區雖未達主要產季，入秋氣溫逐漸適合生長，收穫面積漸增。預估本月收穫面積432公頃，較上月400公頃增加8%；產量為2萬3,853公噸，較上月產量2萬2,131公噸，增產8%，與111年同期產量2萬8,502公噸比較，則減產16%，係因本年受7～9月颱風豪雨影響，田區泥濘積水，種植不易、復耕不及，種植面積減少所致。

結球白菜收穫面積63公頃，產量2,795公噸，較上月增產32%。

結球白菜性喜冷涼氣候，目前為二期作採收期，主產區為彰化及雲林，結球白菜因耐熱品種多元，加上入秋後氣溫逐漸適合生長，收穫面積漸增。預估本月收穫面積63公頃，較上月47公頃增加35%；產量為2,795公噸，較上月產量2,120公噸，增產32%，與111年同期產量4,395公噸比較，減產36%，係因近年病蟲害嚴重、栽培成本提高，影響農民種植意願所致。

青花菜收穫面積20公頃，產量427公噸，較上月增產75%；白花椰菜收穫面積81公頃，產量2,349公噸，較上月增產30%。

青花菜及白花椰菜性喜涼爽濕潤氣候，入秋後氣溫逐漸適合生長，收穫面積漸增。青花菜主產區為雲林、彰化及高雄，預估本月收穫面積20公頃，較上月13公頃增加61%；產量為427公噸，較上月產量244公噸，增產75%，與111年同期產量919公噸比較，則減產54%，係彰化及雲林產區因節氣（閏二月）及前期高溫關係，農民有延後種植情形所致。

白花椰菜主產區為彰化及高雄，目前氣溫尚高，本月採收仍以耐熱品種為主。預估本月收穫面積81公頃，較上月63公頃增加28%；產量為2,349公噸，較上月產量1,813公噸，增產30%，與111年同期產量2,396公噸比較，則減產2%。

短期葉菜收穫面積658公頃，產量1萬2,962公噸，較上月增產17%。

短期葉菜包含不結球白菜及薺菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油



菜及青梗白菜（青江菜）等，主產區為雲林、桃園及高雄。本月為二期與裡作生產交替期，氣候轉涼適合不結球白菜生長而面積增加，蕹菜生產面積則逐漸減少。預估本月收穫面積658公頃，較上月571公頃增加15%；產量為1萬2,962公噸，較上月產量1萬1,091公噸，增產17%，與111年同期產量1萬2,964公噸相當。

二、瓜果類

胡瓜收穫面積552公頃，產量3,312公噸，較上月減產1%。

胡瓜為連續採收型作物，依果實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，本月為二期作採收期，主產區為屏東、雲林、彰化、南投及高雄。預估本月收穫面積552公頃，產

量為3,312公噸，較上月產量3,334公噸，減產1%，與111年同期產量3,900公噸比較，亦減產15%，係部分產區受7～9月颱風及連續降雨影響，收穫面積及產量均較上年同期減少所致。

絲瓜收穫面積1,079公頃，產量5,997公噸，較上月增產19%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且可連續採收，主產區為南投、臺南、嘉義、高雄及屏東，本月為二期作採收期。預估本月收穫面積1,079公頃，產量為5,997公噸，較上月產量5,031公噸，增產19%，與111年同期產量6,448公噸比較，減產7%，係本年部分產區受颱風及豪雨，影響植株開花授粉，致產量較上年同期減少。





西瓜收穫面積 329 公頃，產量 4,631 公噸，較上月減產 58%。

西瓜適合生長在溫暖乾燥且日照充足的環境，本月西瓜主產區為臺南、屏東及高雄等地。因中部及東部產區多於 9 月採收完畢，爰預估本月收穫面積 329 公頃，較上月 582 公頃減少 44%；產量為 4,631 公噸，較上月產量 1 萬 927 公噸，減產 58%，與 111 年同期產量 5,302 公噸比較，減產 13%，係本年部分產區受風災及豪雨影響，致田區浸水、水傷裂果，產量較上年同期減少。

三、根莖類

青蔥收穫面積 406 公頃，產量 9,543 公噸，較上月增產 17%。

青蔥依品種不同，對溫度感應及環境條件要求略有差異，目前主要栽

培品種為四季蔥、粉蔥及北蔥，主產區為彰化、雲林及宜蘭。預估本月收穫面積 406 公頃，較上月 352 公頃增加 15%；產量為 9,543 公噸，較上月產量 8,144 公噸，增產 17%，與 111 年同期產量 6,851 公噸比較，增產 39%，係因上年主產區受病蟲害及氣候影響，單位產量銳減，比較基準較低，加上本年 7 月青蔥種植期市場價格較高，提高農民種植誘因所致。

花卉類

菊花收穫面積 38 公頃，產量 1,216 萬枝，較上月減產 5%。

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主產區為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5～9 月開花）、秋菊（10～11 月開花）及

寒菊（12月～翌年1月開花）。惟栽培上可利用電照或黑布遮光改變日長調節開花期，以達到周年性生產。本年因節氣較晚進入秋菊種植期，收穫面積減少，加上部分收穫期的田區植株有泡水情形影響產量。預估本月收穫面積為38公頃，較上月40公頃減少4%，較111年同期48公頃減少20%；產量為1,216萬枝，較上月1,274萬枝減產5%，較上年同期1,591萬枝減產24%。

洋桔梗收穫面積5.3公頃，產量152萬枝，較上月增產14%。

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏15～25度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、嘉義新港及臺南麻豆等地。洋桔梗為冬季種植作物，本月主要生產縣市為彰

化，目前進入秋植期，預估收穫面積及產量增加。預估本月收穫面積為5.3公頃，較上月4.7公頃增加13%，與111年同期5.5公頃相當；產量為152萬枝，較上月134萬枝增產14%，較上年同期115萬枝增產33%。

火鶴花收穫面積134公頃，產量291萬枝，較上月增產7%。

火鶴花為多年生草本花卉，多栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。因火鶴花性喜溫暖高濕度環境，可周年生產，極具外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5～6月及9～10月，花芽發育初期會經過一段休眠期再繼續發育。本月為火鶴花盛產期，天氣漸轉涼，有利生長。預估本月收穫面積134公頃，與上月面積相當，



較111年同期141公頃減少5%；產量為291萬枝，較上月271萬枝增產7%，較上年同期303萬枝減產4%。

文心蘭收穫面積248公頃，產量377萬枝，與上月減產2%。

文心蘭屬多年生草本植物，主產區為臺中市后里、新社、北屯、石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，切花具外銷優勢。栽培環境多為網室栽培，每年5~6月及9~10月為盛產期。本月為文心蘭盛產期，近3個月受連續下雨日照不足影響產量。預估本月收穫面積248公頃，與上月面積相當，較111年同期254公頃減少3%；產量為377萬枝，較上月386萬枝減產2%，較上年同期396萬枝減產5%。

雜糧類

二期作甘藷產量8萬7,340公噸，較常年同期作增產4%。

臺灣氣候溫暖，環境條件適合甘藷生長，各地可周年種植。依栽培季節可分為裡作、一期作及二期作，主產區為雲林、彰化、臺中、臺南及新北等地。甘藷含有多種維生素及礦物質，並富含膳食纖維，早期作為輔助食糧及家畜混合飼料使用，近年則以食用或食品加工用為主要用途。

112年二期作甘藷生產仍以雲林縣生產面積最大，占臺灣地區生產面積五成以上，次為彰化、臺中、新北、苗栗及花蓮等地。面積部分，雲林產區雖有0910豪雨造成田區淹水，但後續水位退去，加上當下僅種植面積約占五成，對整體影響不大，預估面積較111年同期增加；彰化地區受上年價格不佳影響農民種植意願以及轉作其他作物（如花生），種植面積減少；臺中地區因配合綠色環境給付計畫，部分田區休耕，本期作面積減少；苗栗產區本年受景觀專區政策影響，二期休耕面積擴大，種植面積減少。產量部分，新北、苗栗、臺中、雲林及花蓮等產區，因本年氣候雖有颱風豪雨但對甘藷生長影響不大，預估單位面積產量略增；彰化產區部分田區排水較差延後種植，加上種植面積減少，產量較上年同期減少。

預估112年二期作甘藷收穫面積3,560公頃，與111年同期作3,661公頃比較，則減少3%，與常年同期作3,548公頃相當；產量8萬7,340公噸，與上年同期作8萬7,910公噸比較減產1%，較常年同期作8萬4,367公噸增產4%。

