



112 年 12 月 主要農作物生產預測

洪思賢¹ 徐慧玲¹ 林佩慧¹

果品類

香蕉收穫面積 1 萬 4,569 公頃，總產量 33 萬 666 公噸，較常年減產 6%；秋冬蕉產量 14 萬 8,962 公噸，較 111 年減產 11%。

香蕉主產區分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大產區，依採收季節可分為春夏蕉（2 月下旬～9 月中旬採收）及秋冬蕉（9 月下旬～翌年 2 月上旬採收）。112 年綜合各產區觀測結果，部分產區受黃葉病、人口老化等影響略有減少種植面積，部分產區因檳榔廢園後轉作香蕉，面積略有增加，整體面積變動幅度不大。112 年秋冬蕉受颱風影響，南部及東部產區有葉片破裂、植株折斷倒伏情況，評估全年產量較上年及常年減少。預估 112 年收穫面積 1 萬 4,569 公頃，與 111 年 1 萬 4,616 公頃相當，較常年平均 1 萬 4,975 公頃，則減少

3%；產量 33 萬 666 公噸，較 111 年 35 萬 1,480 公噸減產 6%，與常年平均 35 萬 116 公噸，亦減產 6%。112 年秋冬蕉預估收穫面積為 7,230 公頃，較 111 年 7,316 公頃略減 1%；產量 14 萬 8,962 公噸，較 111 年 16 萬 6,635 公噸，則減產 11%。

番荔枝收穫面積 5,177 公頃，總產量 3 萬 3,900 公噸，較常年減產 37%；冬果產量 2 萬 4,847 公噸，較 111 年減產 13%。

番荔枝為熱帶常綠果樹，主產區為臺東縣，占全臺總種植面積九成以上，栽植品種主要為「釋迦」（俗稱大目釋迦）及「鳳梨釋迦」，種植面積約占各半。大目釋迦透過修剪一年可收夏果及冬果 2 期，夏果主產期 7～9 月、冬果 12 月～隔年 3 月。鳳梨釋迦在臺灣多只收冬果，以夏季修

註 1：農業部農糧署。



剪配合夜間燈照調整產期為12月～隔年4月，避開夏果採後裂果的情形。111年大目釋迦受溫度變化造成裂果、落果，鳳梨釋迦因外銷受阻，農民自主減產；本年則受颱風影響，植株有枝條折損、葉片破損情況，評估產量較上年及常年仍再減少。預估112年收穫面積5,177公頃，較111年5,332公頃減少3%，較常年5,435公頃減少5%；產量3萬3,900公噸，較111年產量3萬9,596公噸減產14%，較常年5萬4,117公噸，則減產37%；冬果預估收穫面積5,177公

頃，較111年5,332公頃減少3%；產量2萬4,847公噸，較111年2萬8,712公噸，則減產13%。

木瓜收穫面積2,605公頃，產量12萬5,834公噸，與常年相當；冬果產量4萬9,402公噸，較111年減產4%。

木瓜為熱帶果樹，主產區為屏東、臺南及南投等縣市，品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可藉由人為疏花疏果進行產期調節，適當調節果實於價高或病害較少



的季節產出，因此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3～8月）及冬果（9月～翌年2月）。112年各產區收穫面積變動不大；111年受5～6月降雨影響減產，惟本年亦受7～10月颱風影響，評估全年產量較上年再有減少。預估112年收穫面積2,605公頃，與111年2,602公頃相當，較常年2,639公頃，則略減1%；產量12萬5,908公噸，較111年12萬8,343公噸減產2%，與常年12萬5,953公噸相當。冬果預估收穫面積2,605公頃，與111年2,602公頃相當；產量

4萬9,443公噸，較111年5萬1,633公噸，則減產4%。

柳橙收穫面積4,747公頃，產量12萬7,557公噸，較常年減產7%。

柳橙為亞熱帶常綠果樹，主產區為臺南、雲林、嘉義及南投等縣市，主產期為10月～翌年2月。柳橙樹勢強健，對環境抗性強，具一年可生長3～4次梢之特性，早期栽培面積快速增加，生產過剩，近年已逐步達產銷平衡，並持續宣導配合生長發育

時期合理化管理水分、肥培及病蟲害，以維持良好產量及果實品質。產量部分，除部分產區中小果期受9月上旬豪雨影響外，多數產區開花著果情形佳，評估產量與上年變動不大。預估112年收穫面積4,747公頃，較111年4,826公頃減少2%，較常年4,973公頃減少5%；產量12萬7,557公噸，較上年12萬6,249公噸增產1%，較常年13萬6,604公噸，則減產7%。

桶柑收穫面積2,926公頃，產量5萬2,975公噸，較常年增產1%。

桶柑為甜橙及寬皮柑之天然雜交種，栽培品系以普通桶柑、大春種桶柑及由桶柑變異之海梨柑最多。主產區為新竹、苗栗、臺中等地淺山丘陵地帶，主要產期為1~2月。桶柑有隔年結果現象，透過適當的修剪及肥培管理，可減緩此現象。112年部分產區因人口老化致廢耕面積增加，





收穫面積較上年略減；產量部分，相較111年西部產區開花著果期受降雨影響，東部產區受7～8月乾旱影響落果，本年主產區多生育狀況良好，產量恢復常年水準。預估112年收穫面積2,926公頃，較111年2,960公頃略減1%，較常年3,051公頃減少4%；產量5萬2,975公噸，較111年4萬7,110公噸增產12%，較常年5萬2,300公噸增產1%。

金柑收穫面積219公頃，產量3,138公噸，較常年增產4%。

金柑為亞熱帶常綠果樹，栽培品種以長實金柑為主，因果色金黃美麗，又稱金棗。主要栽培地區為宜蘭縣，約占全臺金柑種植面積逾90%，主產期為11月～翌年2月。金柑除鮮食外亦可作為蜜餞加工原料，提高產品價值及農民收益，惟該產業受經



營者老化、山區管理不易、野生動物危害等因素，近年可收穫面積逐漸減少。111年主產區受7~8月降水不足影響致著果不良，又受颱風影響有落果、裂果情形，本年開花著果正常，單位產量較上年增加。預估112年收穫面積219公頃，較111年236公頃減少7%，較常年238公頃減少8%；產量3,138公噸，較111年2,098公噸增產50%，較常年3,009公噸，亦增產4%。

茂谷柑收穫面積1,867公頃，產量3萬6,370公噸，較常年增產10%。

茂谷柑為亞熱帶常綠果樹，主產區為臺中、雲林、嘉義、新竹及苗栗，主產期為翌年1~2月。茂谷柑有隔年結果現象，透過適當的肥培管理及修剪，可減緩此現象，另適當的水管理，也可避免裂果。茂谷柑由於糖度高風味佳、耐貯運、果形美觀，受消費者喜愛，農友轉作意願高，惟

至近年可採收面積增加已有趨緩；相較111年部分產區開花著果期受降雨影響，有授粉不良、落果等情形，本年生育正常，可望恢復常年單位面積產量。預估112年收穫面積1,867公頃，較111年1,883公頃略減1%，較常年1,804公頃增加4%；產量3萬6,370公噸，較111年3萬4,257公噸增產6%，較常年3萬2,999公噸，亦增產10%。

棗收穫面積1,735公頃，總產量2萬6,906公噸，較常年減產14%。

棗為熱帶常綠果樹，主產區為高雄、屏東及臺南，主產期為12月～翌年2月，近年來由於新品種選育、經營管理改進及網室栽培普遍化，產量與品質逐年提高，且因品種多樣化，產期已可自12月下旬延長至翌年4月上旬。近年因部分地區轉作其他作





物或廢園，面積略有下降。本年各主產區已逐漸進入開花著果期，惟部分產區受颱風影響有落花、枝條折損情況，評估產量較上年相對減少。預估113年收穫面積1,735公頃，較112年1,751公頃略減1%，較常年1,786公頃減少3%；產量2萬6,906公噸，較112年3萬1,188公噸減產14%，較常年3萬1,358公噸，亦減產14%。

蔬菜類

一、葉菜類

甘藍收穫面積956公頃，產量4萬7,671公噸，較上月增產79%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。本月氣候適合甘藍生育，平地產區進入盛產期，主產區為雲林、彰化、嘉義及臺南，種植面積增加；南投、宜蘭及臺中等高冷地產區為第三期作，收穫面積仍約有240公頃。預估本月收穫面積956公頃，較上月534公頃增加79%；產量為4

萬7,671公噸，較上月產量2萬6,696公噸，增產79%，與111年同期產量4萬2,480公噸比較，則增產12%，係因本年種植期受9月降雨及颱風等因素影響，市場價格佳，農民種植意願提高。

結球白菜收穫面積160公頃，產量7,176公噸，較上月增產66%。

結球白菜性喜冷涼氣候，葉球生長期尤需冷涼和較大日夜溫差。本月氣候適宜生長，目前為裡作採收初期，主產區為雲林和彰化。預估本月收穫面積160公頃，較上月95公頃增加68%；產量為7,176公噸，較上月產量4,329公噸，增產66%，與111年同期產量8,337公噸比較，則減產14%，係因農民種植意願降低，漸次改種其他作物所致。

青花菜收穫面積195公頃，產量3,509公噸，較上月增產307%；白花椰菜收穫面積167公頃，產量4,391公噸，較上月增產43%。

青花菜及白花椰菜性喜涼爽濕潤氣候，本月起氣候適合生長，收穫面積及產量增加，目前為裡作採收初期。青花菜主產區為雲林及嘉義，預估本月收穫面積195公頃，較上月55公頃增加257%；產量為3,509公噸，較上月產量862公噸，增產



307%，與111年同期產量3,341公噸比較，亦增產5%。

白花椰菜主產區為彰化、高雄及嘉義，預估本月收穫面積167公頃，較上月118公頃增加42%；產量為4,391公噸，較上月產量3,063公噸，增產43%，與111年同期產量4,022公噸比較，亦增產9%。

短期葉菜收穫面積609公頃，產量1萬2,271公噸，較上月增產2%。

短期葉菜包含不結球白菜及蕹菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油菜及青梗白菜（青江菜）等，主產區為雲林、桃園及高雄。本月為裡作生產期，氣候轉涼，以生產不結球白菜

為主。預估本月收穫面積609公頃，較上月602公頃增加1%；產量為1萬2,271公噸，較上月產量1萬2,042公噸，增產2%，與111年同期產量1萬2,427公噸比較，則減產1%。

二、瓜果類

胡瓜收穫面積452公頃，產量2,388公噸，較上月增產26%。

胡瓜為連續採收型作物，依果實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，本月為二期作採收末期與裡作生產交替期，主產區為屏東、高雄及彰化。南投、雲林及嘉義地區二期作採收期已結束，收穫面積較上月減少；高雄及屏東地區進入裡作生產期，收穫面積及產量較上月增加。預估本月收穫面積452公頃，產量為2,388公噸，較上月產量1,896公噸，增產26%，與111年同期產量2,825

公噸比較，則減產15%，係因屏東地區受氣候影響，裡作種植期延後，致收穫面積及產量均較上年同期減少。

絲瓜收穫面積530公頃，產量1,389公噸，較上月減產66%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且可連續採收，本月為二期作採收末期，主產區為臺南、高雄及屏東。南投、雲林及嘉義二期作採收期已結束，收穫面積較上月減少。預估本月收穫面積530公頃，產量為1,389公噸，較上月產量4,052公噸，減產66%，與111年同期產量1,345公噸比較，則增產3%。

西瓜收穫面積110公頃，產量1,698公噸，較上月減產41%。

西瓜適宜溫暖乾燥且日照充足的環境，本月主產區為屏東及高雄，





臺南及嘉義則為零星採收，其餘產區二期作採收期已結束，收穫面積及產量減少。預估本月收穫面積110公頃，較上月198公頃減少44%；產量為1,698公噸，較上月產量2,898公噸，減產41%，與111年同期產量1,798公噸比較，亦減產6%。

三、根莖類

青蔥收穫面積376公頃，產量8,415公噸，較上月增產13%。

青蔥依品種不同，對溫度感應及環境條件要求略有差異，主要栽培品種為四季蔥、粉蔥及北蔥，目前為二期作採收後期及裡作採收初期，主產區為雲林、彰化及宜蘭。預估本月收穫面積376公頃，較上月358公頃增加5%；產量為8,415公噸，較上月產量

7,459公噸，增產13%，與111年同期產量8,353公噸比較，亦增產1%。

裡作蘿蔔收穫面積1,230公頃，總產量3萬7,566公噸，較上年減產23%，較常年減產34%。

蘿蔔性喜冷涼，具半耐寒性而不耐熱，適合秋冬季栽培，裡作蘿蔔主產區為高雄、雲林、彰化及嘉義。彰化、雲林及臺南產區因市場價格低，契作面積減少，加上種植初期受小犬颱風影響，部分田區受損嚴重，致收穫面積及單位產量亦減少；至高雄美濃產區則因颱風致紅豆延後種植，部分農民轉作白玉蘿蔔，種植面積則較上年增加。預估本(112/113)年裡作收穫面積1,230公頃，較112年同期1,453公頃減少15%，較常年同期1,641公頃減少



25%；產量為3萬7,566公噸，較112年同期4萬8,556公噸減少23%，較常年同期5萬6,545公噸，亦減產34%。

花卉類

菊花收穫面積36公頃，產量1,202萬枝，與上月產量相若。

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主產區為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5～9月開花）、秋菊（10～11月開花）及寒菊（12月～翌年1月開花）。但栽培上可利用電照或黑布遮光改變日長調節開花期，以達到周年性生產。天氣轉涼，進入秋冬菊種植期，預估收穫面積略減及單位產量略增。預估本月

收穫面積為36公頃，較上月38公頃減少5%，較111年同期64公頃減少43%；本月產量預估為1,202萬枝，與上月1,199萬枝產量相若，較111年同期2,758萬枝產量減產56%。

洋桔梗收穫面積7.7公頃，產量211萬枝，較上月增產39%。

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏15～25度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、嘉義新港及臺南麻豆等地。洋桔梗為冬季種植作物，本月進入生產期，預估本月收穫面積及產量增加。預估本月收穫面積7.7公頃，較上月5.5公頃增加40%，較111年同期9.6公頃減少20%；產量為211萬枝，較上月

152萬枝增產39%，較111年261萬枝減產19%。

火鶴花收穫面積134公頃，產量249萬枝，較上月減產10%。

火鶴花為多年生草本花卉，多栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。喜溫暖高濕度環境，可周年生產，極具外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5~6月及9~10月，花芽發育初期會經過一段休眠期再繼續發育。本月非火鶴花盛產期，氣溫漸低，早晚溫差大，評估本月產量略減。預估本月收穫面積134公頃，與上月面積相當，較111年同期141公頃減少5%；產量249萬枝，較上月產量277萬枝減產10%，較111年同期289萬枝減產14%。

文心蘭收穫面積249公頃，產量421萬枝，較上月產量增產12%。

文心蘭屬多年生草本植物，主產區為臺中市后里、新社、北屯、石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，切花具外銷優勢。栽培環境多為網室栽培，每年5~6月及9~10月為盛產期。由於疫情趨緩，外銷量漸

增，以及部分縣市產期調節至耶誕節，評估本月產量增加。預估本月收穫面積249公頃，與上月面積相當，較111年同期254公頃減少2%；產量為421萬枝，較上月產量375萬枝增產12%，較111年同期產量415萬枝增產1%。

雜糧類

裡作甘藷種植面積3,479公頃，較常年同期作增加4%。

國內裡作甘藷主要分布於中南部雲林、彰化及臺南等縣市，尤以雲林縣生產面積最大，臺南市次之。裡作甘藷之栽培多與一、二期水稻輪作，並配合稻作產期調整種植期間。近年甘藷種植面積受政府推動大糧倉計畫，推廣種植轉（契）作甘藷並設置集團產區，契作價格及種植面積穩定。除受相關政策影響外，主產區多與農民團體或農企業主體配合以契作方式生產，亦受其預估需求調整種植面積。至未參與契作之農戶，其種植意願隨種植品種品質及價格而有所調整。

依據主產區觀測結果，113年裡作契作面積穩定，及上期作甘藷價格佳影響，農民種植意願高，預估113年裡作種植面積3,479公頃，與112年同期作種植面積3,234公頃比較，增加8%；若與常年同期作種植面積3,334公頃比較，則增加4%。