

113 年 4 月主要農作物生產預測

洪思賢¹ 黃崇瑜¹ 林佩慧¹

果品類

113 年香蕉收穫面積 1 萬 4,287 公頃，總產量 34 萬 9,022 公噸，較常年增產 2%；春夏蕉產量 18 萬 4,899 公噸，較 112 年增產 1%。

香蕉主產區分布於中南部及東部地區，屏東縣為最大產區，依採收季節可分為春夏蕉（2 月下旬～9 月中旬採收）及秋冬蕉（9 月下旬～翌年 2 月上旬採收）。113 年綜合各產區觀測結果，部分產區受黃葉病、人口老化等影響略有減少種植面積，部分產區則因檳榔廢園後轉作香蕉，面積略有增加，整體面積變動幅度不大；產量部分，相對 112 年受 7～10 月颱風影響，評估產量較上年增加。預估 113 年收穫面積 1 萬 4,287 公頃，較 112 年 1 萬 4,492 公頃略減 1%，較常年 1 萬 4,833 公頃減少 4%；產量 34 萬 9,022 公噸，較 112 年 33 萬 3,234 公噸增產 5%，較常年 34 萬 3,751 公噸增產 2%。113 年春夏蕉預估收穫面積為 7,142 公頃，較 112 年 7,338 公

頃減少 3%；產量 18 萬 4,899 公噸，較 112 年 18 萬 2,247 公噸，則增產 1%。

113 年番石榴收穫面積 7,855 公頃，總產量 20 萬 4,407 公噸，較常年增產 8%；上半年果產量 9 萬 9,331 公噸，較 112 年增產 13%。

番石榴為熱帶常綠果樹，周年可開花結實，主產區分布於高雄、臺南、彰化及屏東等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1～6 月）及下半年果（7～12 月）。番石榴運用不同修剪時期調節生產，以配合市場需求，並可避開 6～9 月水果盛產期及颱風豪雨季節。番石榴技術門檻較低，近年收穫面積有增加趨勢，又近 5 年間 108、110、111 年有豪雨、水災、乾旱等影響，112 年亦遇 7～10 月颱風，113 年評估產量相對增加。預估 113 年收穫面積 7,855 公頃，與 112 年 7,874 公頃相當，較常年 7,748 公頃略增 1%；

| 註 1：農業部農糧署。



產量 20 萬 4,407 公噸，較 112 年 18 萬 8,045 公噸增產 9%，較常年 19 萬 132 公噸，則增產 8%。上半年果預估收穫面積 7,855 公頃，與 112 年 7,874 公頃相當；產量 9 萬 9,331 公噸，較 112 年 8 萬 7,914 公噸增產 13%。

113 年木瓜收穫面積 2,561 公頃，產量 13 萬 1,149 公噸，較常年增產 5%；夏果產量 7 萬 7,875 公噸，較 112 年增產 5%。

木瓜為熱帶果樹，主產區為屏東、臺南及南投等縣市，品種以台農 2 號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可藉由人為疏花疏果進行產期調節，適當調節果實於價高或病害較少的季節產出，因此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3～8 月）及冬果

（9 月～翌年 2 月）。113 年各產區收穫面積變動不大；產量部分，近 5 年產量受 108、110、111 年水災、豪雨影響，112 年部分產區遭遇高溫乾旱、7～10 月颱風，113 年評估產量相對提升。預估 113 年收穫面積 2,561 公頃，較 112 年 2,585 公頃略減 1%，較常年 2,638 公頃減少 3%；產量 13 萬 1,149 公噸，較 112 年 12 萬 2,860 公噸增產 7%，較常年 12 萬 4,491 公噸，亦增產 5%。夏果預估收穫面積 2,561 公頃，較 112 年 2,585 公頃略減 1%；產量 7 萬 7,875 公噸，較 112 年 7 萬 4,007 公噸，則增產 5%。

113 年鳳梨收穫面積 6,926 公頃，產量 36 萬 7,293 公噸，較常年減產 8%。

鳳梨主產區分布於屏東、臺南、高雄、嘉義及南投等縣市，栽培品種

以台農 17 號（金鑽）為大宗，主產期為 3～6 月，其餘尚有加工用之開英種（土鳳梨）、台農 20 號（牛奶鳳梨）、台農 16 號（甜蜜蜜）、台農 22 號（西瓜鳳梨）、台農 23 號（芒果鳳梨）等不同產期之品種。鳳梨自定植至採收約需 18 個月，自然狀態下產期集中於 6～8 月，然因夏季高溫多雨易使肉質果比率上升。為提升果實品質且避免供過於求，並因應消費市場需求或配合鮮果外銷，農民多實施產期調節，於 8～10 月進行催花處理。生產春果，農糧署也持續推廣不同產期鳳梨品種，調節鳳梨市場供貨時間。鳳梨早期栽培模式以 3 年 2 收為主，近幾年逐漸轉為 2 年 1 收模式，又近年受外銷受阻、農業人口老化及資材成本上漲等因素影響，部分產區農友種植意願降低。預估 113 年收穫面積 6,926 公頃，較 112 年 7,128 公頃減少 3%，較常年 7,697 公頃減少 10%；產量 36 萬 7,293 公噸，較 112 年 38 萬 1,501 公噸減少 4%，較常年 40 萬 1,399 公噸，亦減產 8%。

113 年梅收穫面積 3,266 公頃，產量 1 萬 4,831 公噸，較常年減產 12%。

梅為多年生落葉果樹，主產區為高雄、南投、臺東、臺南、臺中及花蓮等縣市之中低海拔山坡地，產期為每年 3 月下旬～5 月下旬。為健全梅產業發展，農糧署持續輔導採採梅農友與加工

場契作，並對有競爭力地區輔導轉型為手採梅。近 5 年收穫面積受人口老化等因素影響，有逐年下降趨勢；113 年部分產區雖因氣溫影響致花序不齊，惟相較 112 年有雨水不足的情形，評估整體產量仍較上年略有增加。預估 113 年收穫面積 3,266 公頃，與 112 年 3,279 公頃相當，較常年 3,418 公頃減少 4%；產量 1 萬 4,831 公噸，較 112 年 1 萬 4,022 公噸增產 6%，較常年 1 萬 6,826 公噸，則減產 12%。

113 年梨收穫面積 4,851 公頃，產量 9 萬 1,499 公噸，較常年減產 6%。

臺灣梨可分為高需冷性溫帶梨，如豐水、新世紀、新興、幸水、新雪梨等，低需冷性梨，如橫山、晶圓、蜜雪梨等，及高接梨，以優良溫帶梨品種之花芽，經滿足低溫需求後作為接穗。溫帶梨主產區為臺中市和平區，於 4 月上旬開花，8～11 月收穫；高接梨主產區為臺中市東勢區、苗栗縣卓蘭鎮等，於 12～2 月間嫁接，5～8 月收穫。本年高接梨主產縣市受 1 月寒流影響，有授粉不佳、重新嫁接之情形，惟 112 年亦有年初低溫造成危害，初估產量與上年相當，後續仍須持續觀測重新嫁接後果實生育情形。預估 113 年收穫面積 4,851 公頃，與 112 年 4,860 公頃相當，較常年 4,991 公頃減少 3%；產量 9 萬 1,499 公噸，與 112 年產量 8 萬 8,570

公噸相當，較常年9萬7,218公噸，則減產6%。

113年本地種芒果收穫面積2,304公頃，產量1萬6,697公噸，較常年增產1%。

本地種芒果俗稱土檬果、柴槎、土槎仔，主產區分布於屏東、臺南及高雄等縣市，以屏東縣收穫面積最多，主要產期為3~5月。本地種芒果果實不大，惟酸甜風味十足且香氣濃郁，深受消費者喜愛，其幼果可供製作情人果，成熟果可製作蜜餞、芒果干、冰沙及芒果汁等加工產品。近年部分產區有廢園面積增加情形，亦有部分田區轉作改良種芒果等作物，面積略有減少，113年開花情形尚佳，目前屏東縣早果已逐漸開始採收，初估產量與上年相當。預估113年收穫面積2,304公頃，與112年2,309公頃相當，較常年2,434公頃減少5%；產量1萬6,697公噸，較112年1萬6,192公噸增產3%，較常年1萬6,524公噸，亦增產1%。

113年改良種芒果收穫面積1萬3,649公頃，產量15萬4,725公噸，較常年增產1%。

改良種芒果栽培品種以愛文最多，金煌次之，凱特、海頓及玉文等其他品種栽培面積較少。主產區分布

於臺南、屏東及高雄等縣市，其中又以臺南市種植面積最多，約占全臺改良種芒果種植面積50%。各地產期略有差異，屏東地區主要產期為5~6月，臺南地區約為6月中旬~8月，透過栽植不同品種或產期調節，可提早或延後產期，使4~10月皆有芒果可供應市場。本年各產區芒果已進入開花著果期，部分產區有開花參差或受氣溫高低變化等影響，造成開花結果不佳、酥花等情形，實際產量仍須持續觀察實際生理落果及農友疏果、套袋後生育情形。預估113年收穫面積1萬3,649公頃，較112年1萬3,757公頃略減1%，與常年1萬3,680公頃相當；產量15萬4,725公噸，較112年16萬3,730公噸減產5%，較常年15萬3,326公噸，則增產1%。

113年荔枝收穫面積9,536公頃，產量5萬6,815公噸，較常年增產2%。

荔枝為亞熱帶常綠果樹，栽培品種以黑葉為最多，其次為早熟種玉荷包，另有部分栽培地方品種或新育成品種。主產區為高雄、臺中、南投及臺南等縣市，主要產期為5~8月。荔枝種植面積近年受天然災害、蟲害及務農人口老化等影響，面積逐漸減少；近年平均產量波動較大，係因110年遭遇高溫乾旱、111年有低溫降雨致授粉不良，本年則受氣溫高低變化影響，各產區開花情形普遍

不佳，且須持續觀測後續生理落果及果實發育情形。預估113年收穫面積9,536公頃，與上年9,549公頃相當，較常年9,667公頃略減1%；產量5萬6,815公噸，較上年6萬6,205公噸減產14%，較常年5萬5,528公噸，則增產2%。

113年葡萄（夏果）收穫面積2,195公頃，產量4萬2,995公噸，較常年減產2%。

葡萄為多年生溫帶果樹，主產區為彰化、臺中、苗栗及南投。葡萄產期調節技術發達，最普遍的栽培模式為6~7月生產夏果及12~翌年1月生產冬果之1年2收模式，另有利用溫室設施栽培生產3~5月早春葡萄或僅收夏果等1年1收栽培模式，葡萄（夏果）預測則包含早春葡萄或夏果。臺灣葡萄栽培品種以鮮食葡萄巨峰為主，與進口葡萄具區隔性，惟葡萄雖具高經濟價值，因栽培技術門檻高，耗費勞力且易受氣候影響，近年有廢園及轉作其他作物之趨勢，種植面積較常年減少。本年彰化產區早春葡萄產量正常，已陸續產出，其他產區夏果相對112年受3月鋒面及4月雨害影響，評估整體產量較上年增加。預估113年收穫面積2,195公頃，與112年2,205公頃相當，較常年2,319公頃減少5%；產量4萬2,995公噸，與112年3萬8,946公噸

增產10%，較常年4萬3,907公噸，則減產2%。

蔬菜類

一、葉菜類

甘藍收穫面積494公頃，產量2萬5,883公噸，較上月減產18%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。本月甘藍雲林及彰化等平地產區已漸離適栽期，宜蘭及南投等高冷地產區一期作甘藍則陸續開始採收。預估本月收穫面積494公頃，較上月649公頃減少24%；產量為2萬5,883公噸，較上月3萬1,550公噸，減產18%，與112年同期2萬5,427公噸比較，則增產2%。

結球白菜收穫面積62公頃，產量2,766公噸，較上月減產53%。

結球白菜喜冷涼氣候，葉球生長期尤需冷涼和較大日夜溫差，主產區為彰化及雲林。本月氣溫逐漸升高，冬季適栽品種多於上月完成採收，除主產區仍有部分未採收外，餘為零星種植，整體收穫面積及產量較上月減少，彰化產區表示，近年結球白菜因病蟲害嚴重及生產成本高，農民種植意願略減。預估本月收穫面積62公頃，較上月119公頃減少48%；產量為2,766公噸，較上月5,843公噸，減產53%，與112年同期3,253公噸比較，則減產15%。

青花菜收穫面積 132 公頃，產量 2,662 公噸，較上月減產 52%；白花椰菜收穫面積 122 公頃，產量 3,468 公噸，較上月減產 22%。

青花菜及白花椰菜喜涼爽濕潤氣候，本月起氣候漸不適合生育，整體收穫面積及產量減少。青花菜主產區為雲林及嘉義，預估本月收穫面積 132 公頃，較上月 283 公頃減少 53%；產量為 2,662 公噸，較上月 5,554 公噸，減產 52%，與 112 年同期 2,683 公噸比較，則減產 1%。

白花椰菜主產區為彰化及高雄，預估本月收穫面積 122 公頃，較上月

155 公頃減少 21%；產量為 3,468 公噸，較上月 4,434 公噸，減產 22%，與 112 年同期 2,730 公噸比較，則增產 27%，係彰化產區上年因閏二月影響，田區配合節氣種植水稻，提前採收所致。

短期葉菜收穫面積 546 公頃，產量 1 萬 987 公噸，較上月增產 8%。

短期葉菜包含不結球白菜及蕓菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油菜及青梗白菜（青江菜）等，主產區為雲林、桃園及高雄。本月氣溫逐漸回暖，各產區陸續將冬季作物（不



結球白菜)轉植夏季作物(蕹菜)，其中雲林產區種植夏季作物面積顯著增加。預估本月收穫面積546公頃，較上月509公頃增加7%；產量為1萬987公噸，較上月1萬138公噸，增產8%，與112年同期1萬859公噸比較，增產1%。

二、瓜果類

胡瓜收穫面積469公頃，產量3,607公噸，較上月減產11%。

胡瓜為連續採收型作物，依果實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜(花胡瓜)。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，主產區為屏東、高雄、彰化及雲林。本月為裡作與一期作生產交替期，雲林產區裡作胡瓜已採收結束，南部產區則進入一期作採收期，各產區種植面積及產量互有消長，目前氣候較上年穩定，預估本月收穫面積469公頃，產量為3,607公噸，較上月4,049公噸減產11%，與112年同期3,207公噸比較，則增產12%。

絲瓜收穫面積1,077公頃，產量5,558公噸，較上月增產150%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且可連續採收，主產區為臺南、屏東及高雄。本月臺南和高雄產區持續採收，其他中南部產區包括南投、雲林、嘉義及臺南等縣市，一期作絲瓜

開始採收，收穫面積及產量較上月大幅增加。預估本月收穫面積1,077公頃，產量為5,558公噸，較上月2,220公噸增產150%，與112年同期5,248公噸比較，則增產6%。

西瓜收穫面積451公頃，產量7,540公噸，較上月增產23%。

西瓜適宜溫暖乾燥且日照充足的環境，主產區為臺南、屏東及高雄。本月為裡作與一期作生產交替期，臺南和高雄產區持續採收，彰化及嘉義一期作開始採收，致收穫面積及產量較上月增加。預估本月收穫面積451公頃，較上月387公頃增加17%；產量為7,540公噸，較上月6,124公噸增產23%，與112年同期1萬600公噸比較，則減產29%，其中雲林產區年初氣溫不穩延後採收，以及臺南產區適逢清明節慶提前採收。

三、根莖類

青蔥收穫面積359公頃，產量8,743公噸，較上月增產1%。

青蔥依品種不同，對溫度感應及環境條件要求略有差異，主要栽培品種為四季蔥、粉蔥、北蔥及大蔥，主產區為雲林、彰化及宜蘭。本月為一期作採收初期，收穫面積及產量略增。預估本月收穫面積359

公頃，較上月356公頃增加1%；產量為8,743公噸，較上月8,673公噸增產1%，與112年同期7,366噸比較，則增產19%，係因部分產區上年種植生育期間受病蟲害及山區缺水致產量減少所致。

一期作薑收穫面積745公頃，總產量2萬7,710公噸，較上年同期減產1%。

薑為宿根性多年生草本植物，食用部位為其根莖，喜溫暖氣候，主產區為南投、臺東、臺中及苗栗等地。2月起各地陸續種植，各產區多因異地種植、山區水源不穩及人口老化等因素，種植面積呈現下降趨勢，另本年氣候穩定，部分主產區未受上年颱風及豪雨影響，單位面積產量可恢復正常水準。預估本年一期作收穫面積745公頃，較112年797公頃減少7%，與常年平均比較亦減少11%；產量2萬7,710公噸，較112年2萬7,986公噸減產1%，與常年平均比較，則增產18%。

裡作大蒜收穫面積5,313公頃、產量5萬1,023公噸，較上年增產2%，較常年增產6%。

大蒜主產區為雲林縣，占總產量9成以上，另臺南市、彰化縣及嘉義縣等地區亦有生產，目前彰化產區和美早蒜已採收，雲林等產區大片黑

品種自3月中下旬起陸續採收。主產區因近幾年價格佳，增加農民種植意願。經各基層公所現地勘查及巡迴觀測，種植面積5,313公頃，較112年5,221公頃增加2%，與常年5,008公頃比較，亦增加6%；產量部分，目前氣候平順，單位面積產量經辦理坪割，回復正常年水準，預測總產量為5萬1,023公噸，較112年期之4萬9,803公噸增產2%，與常年平均4萬8,164公噸比較，亦增產6%。

裡作洋蔥收穫面積1,668公頃、產量8萬3,118公噸，較上年增產36%，較常年增產40%。

洋蔥主產區為屏東縣、彰化縣、雲林縣及高雄市等地區，產區常隨著契作業主及農民意願而有所消長。近2年洋蔥價格佳，農民轉作意願略增。本年期種植面積經主產區觀測，屏東產區受連作障礙影響，雲林、彰化產區因契作關係，致主產區略往中部產區移動趨勢。預測收穫面積1,668公頃，較112年1,272公頃，增加31%，與常年平均1,279公頃比較，亦增加30%；產量部分，種植初期略受高溫、112年10月初小犬颱風影響，後期生長態勢逐漸回復，單位面積產量略增，總產量推估為8萬3,118公噸，較112年產量6萬1,228公噸增產36%，與常年平均產量5萬9,281公噸比較，亦增產40%。

花卉類

菊花收穫面積 39 公頃，產量 1,306 萬枝，較上月增產 5%。

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主產區為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5～9 月開花）、秋菊（10～11 月開花）及寒菊（12～翌年 1 月開花）。栽培期間可利用電照或黑布遮光改變日長調節開花期，以達到周年性生產。清明節即將到來，預估本月種植面積及產量略增；本年經田區踏勘發現，農民因人力關係今年種植面積較去年減少。預估本月收穫面積為 39 公頃，較上月 37 公頃增加 5%，較 112 年同期 42 公頃減少 7%；本月產量預估為 1,306 萬枝，較上月 1,250 萬枝增產 5%，與 112 年同期 1,401 萬枝比較，則減產 7%。

洋桔梗收穫面積 3.6 公頃，產量 102 萬枝，較上月減產 26%。

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏 15～25 度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、嘉義新港及臺南麻豆等地。本月天氣漸熱，產量有減少的趨勢。預估本月可採收面積為 3.6 公頃，較上月 5.1 公頃

減少 30%，較上年同期 7.6 公頃減少 53%；產量為 102 萬枝，較上月減產 26%，與上年 241 萬枝比較，亦減產 58%。

火鶴花收穫面積 138 公頃，產量 269 萬枝，較上月增產 11%。

火鶴花為多年生草本花卉，多栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。喜溫暖高濕度環境，可周年生產，極具外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年 5～6 月及 9～10 月，花芽發育初期會經過一段休眠期再繼續發育。天氣漸暖，預估單位面積產量增加。預估本月收穫面積 138 公頃，較上月面積相當，較 112 年同期 130 公頃增加 6%；產量 269 萬枝，較上月 242 萬枝增加 11%，與 112 年同期 226 萬枝比較，亦增產 19%。

文心蘭收穫面積 247 公頃，產量 410 萬枝，較上月增產 2%。

文心蘭屬多年生草本植物，主產區為臺中市后里、新社、北屯、石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，切花具外銷優勢。栽培環境多為網室栽培，每年 5～6 月及



9～10月為盛產期。天氣漸漸回暖，評估本月產量略增。預估本月收穫面積247公頃，與上月及112年同期面積相當；產量為410萬枝，較上月401萬枝增產2%，與112年同期400萬枝比較，亦增產2%。

雜糧類

一期作甘藷種植面積較上年同期作增加36%。

臺灣地區因氣候溫暖，各地均可周年種植甘藷，栽培季節可分為裡作及一、二期作，主產區以雲林、彰化、臺中、臺南、屏東及嘉義等縣市最多。其用途早期為人類的輔助食糧及家畜的混合飼料，近年則以鮮食為主，部分用於食品加工。

一期作甘藷生產主要分布於雲林、彰化、臺中、苗栗等地區。據產地觀測，因112年二期作甘藷價格頗佳，農民種植意願增加，預測種植面

積較上年同期增加。總體預估一期作甘藷種植面積1,993公頃，較上年同期作1,470公頃增加36%，與常年同期作種植面積1,998公頃相若。

一期作落花生種植面積較常年同期作減少11%。

落花生主產區為雲林、彰化及嘉義等地區，一年可種植二期作。因常與其他作物輪作，栽培面積常隨輪作作物及前期之價格而變動。

近年落花生市場需求穩定，但一期作採收期容易受到梅雨或豪雨影響採收及品質，進而影響農民種植意願；再經產地觀測，因近年甘藷價格佳，雲林產區部分田區轉作甘藷，致面積較上年同期減少。總體預估113年一期作落花生種植面積5,567公頃，較上年同期作種植面積5,783公頃減少4%，與常年同期作6,232公頃比較，亦減少11%。