

113年11月主要農作物生產預測

洪思賢¹ 黃崇瑜¹ 林佩慧¹

果品類

香蕉收穫面積1萬4,317公頃，總產量29萬4,774公噸，較常年減產14%；秋冬蕉產量12萬8,248公噸，較112年減產15%。

香蕉主產區分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大產區，依採收季節可分為春夏蕉（2月下旬～9月中旬採收）及秋冬蕉（9月下旬～翌年2月上旬採收）。113年綜合各產區觀測結果，部分產區受黃葉病、人口老化等影響略有減少種植面積，部分產區則因檳榔廢園後轉作香蕉略有增加種植面積，整體面積變動幅度不大；產量部分，112年受7～10月颱風影響，113年7、10月亦遭遇颱風，評估產量較上年再有減少。預估113年收穫面積1萬4,317公頃，較112年1萬4,492公頃略減1%，較常年平均1萬4,833公頃減少3%；產量29萬4,774公噸，較112年33萬3,362公噸減產12%，較常年平均34萬3,751公噸，亦減產14%。113年秋冬蕉預估收穫面積為7,162公頃，與112年7,154公頃相當；產量12萬8,248公噸，較112年15萬1,120公噸，亦減產15%。

番荔枝收穫面積4,992公頃，總產量3萬7,049公噸，較常年減產24%；冬果產量2萬8,134公噸，較112年增產100%。

番荔枝為熱帶常綠果樹，主產區為臺東縣，占全臺總種植面積9成以上，栽植品種主要為「釋迦」（俗稱大目釋迦）及「鳳梨釋迦」，種植面積約占各半。大目釋迦透過修剪一年可收夏果及冬果2期，夏果主產期7～9月、冬果12月至隔年3月。鳳梨釋迦在臺灣多只收冬果，以夏季修剪配合夜間燈照調整產期為12月至隔年4月，避開夏果採後裂果的情形。113年番荔枝面積受轉作及廢園影響較常年減少，相較於112年受7～10月颱風影響，113年7、10月仍有颱風侵襲，評估產量相對於上年增加、常年減少。預估113年番荔枝收穫面積4,992公頃，較112年5,041公頃略減1%，較常年5,418公頃減少8%；產量3萬7,049公噸，較112年產量1萬9,442公噸增產91%，較常年4萬8,566公噸，則減產24%；冬果預估收穫面積4,992公頃，較112年5,041公頃減少1%；產量2萬8,134公噸，較112年1萬4,059公噸，則增產100%。

註1：農業部農糧署。

木瓜收穫面積2,556公頃，產量10萬9,082公噸，較常年減產12%；冬果產量4萬126公噸，較112年減產18%。

木瓜為熱帶果樹，主產區為屏東、臺南及南投等縣市，品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可藉由人為疏花疏果進行產期調節，適當調節果實於價高或病害較少的季節產出，因此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3～8月）及冬果（9月～翌年2月）。113年各產區收穫面積變動不大；產量部分，108、110、111、112年受颱風、豪雨、乾旱等影響，113年同受颱風侵害，評估產量較上年再有減少。預估113年收穫面積2,556公頃，較112年2,587公頃略減1%，較常年2,638公頃減少3%；產量10萬9,082公噸，較112年12萬2,690公噸減產11%，較常年12萬4,435公噸，亦減產12%。冬果預估收穫面積2,556公頃，較112年2,587公頃略減1%；產量4萬126公噸，較112年4萬8,911公噸，亦減產18%。

柳橙收穫面積4,607公頃，產量10萬8,591公噸，較常年減產16%。

柳橙為亞熱帶常綠果樹，主產區為臺南、雲林、嘉義及南投等縣市，主要產期為10月～翌年2月。柳橙樹勢強健，對環境抗性強，具一年可生長3～4次梢之特性，早期栽培面積快

速增加，生產過剩，近年已逐步達產銷平衡，並持續宣導配合生長發育時期合理化管理水分、肥培及病蟲害，以維持良好產量及果實品質。113年受颱風影響，部分產區有傷果或落果等情形，相較112年花期正常，果實生育日數充足，評估產量較上年減少。預估113年收穫面積4,607公頃，較上年4,733公頃減少3%，較常年4,901公頃減少6%；產量10萬8,591公噸，較上年12萬2,163公噸減產11%，較常年12萬9,860公噸，亦減產16%。

桶柑收穫面積2,898公頃，產量4萬7,387公噸，較常年減產8%。

桶柑為甜橙及寬皮柑之天然雜交種，栽培品系以普通桶柑、大春種桶柑及由桶柑變異之海梨柑最多。主產區為新竹、苗栗、臺中等地淺山丘陵地帶，主要產期為1～2月。桶柑有隔年結果現象，透過適當的修剪及肥培管理，可減緩此現象。113年部分產區因人口老化導致廢耕，收穫面積較上年略減；產量部分，相較112年多數產區生育狀況良好，本年主產區各受颱風不等影響，評估產量較上年及常年減少。預估113年收穫面積2,898公頃，較112年2,925公頃略減1%，較常年3,005公頃減少4%；產量4萬7,387公噸，較112年5萬890公噸減產7%，較常年5萬1,342公噸，亦減產8%。

葡萄（冬果）收穫面積2,108公頃，產量2萬1,083公噸，較常年減產6%。

葡萄為多年生溫帶果樹，主產區為彰化、苗栗、臺中及南投。葡萄產期調節技術發達，最普遍的栽培模式為6~7月生產夏果及12月~翌年1月生產冬果之一年二收模式，另有利用溫室設施栽培生產3~5月早春葡萄或僅收夏果等一年一收栽培模式，葡萄（夏果）預測包含早春葡萄或夏果，葡萄（冬果）預測則僅包含冬果。臺灣葡萄栽培品種以鮮食葡萄巨峰為主，與進口葡萄具區隔性，惟葡萄雖具高經濟價值，因栽培技術門檻高，耗費勞力且近年常因氣候致催芽期授粉不良等情形，農民有廢園及轉種其他作物之趨勢，收穫面積逐漸減少；產量部分，113年部分產區冬果受露菌病危害，又部分產區則受9月下旬豪雨影響落果，評估本年冬果產量較上年及常年減少。預估113年收穫面積2,108公頃，較112年2,192公頃減少4%，較常年2,303公頃減少8%；產量2萬1,083公噸，較112年2萬2,185公噸減產5%，較常年2萬2,480公噸，亦減產6%。

金柑收穫面積210公頃，產量2,196公噸，較常年減產20%。

金柑為亞熱帶常綠果樹，栽培品種以長實金柑為主，因果色金黃美麗，

又稱金棗。主要栽培地區為宜蘭縣，約占全臺金柑種植面積逾90%，主產期為11月~翌年2月。金柑除鮮食外亦可作為蜜餞加工原料，提高產品價值及農民收益，惟該產業受經營者老化、山區管理不易、野生動物危害等因素，近年收穫面積逐漸減少。相較112年主產區開花著果正常，113年受颱風影響有落果、裂果情形，評估產量較上年及常年減少。預估113年收穫面積210公頃，較112年219公頃減少4%，較常年235公頃減少11%；產量2,196公噸，較112年2,966公噸減產26%，較常年2,761公噸，亦減產20%。

茂谷柑收穫面積1,856公頃，產量34,892公噸，較常年增產1%。

茂谷柑為亞熱帶常綠果樹，主產區為臺中、雲林、嘉義、新竹及苗栗，主產期為翌年1~2月。茂谷柑有隔年結果現象，透過適當的肥培管理及修剪，可減緩此現象，另適當的水分管理，也可避免裂果。茂谷柑由於糖度高風味佳、耐貯運、果形美觀，受消費者喜愛，農友轉作意願高，惟近年可採收面積增加趨勢已略有減緩；相較112年多數產區生育正常，本年部分產區開花著果期受豪雨、颱風影響，有授粉不良、落果等情形，評估產量較上年減少。預估113年收穫面積1,856公頃，與112年1,848公頃相當，較常年1,841公頃略增1%；產量3萬4,892公噸，較112

年3萬7,085公噸減產6%，較常年3萬4,500公噸，則略增1%。

棗收穫面積1,733公頃，總產量2萬3,855公噸，較常年減產24%。

棗為熱帶常綠果樹，主產區為高雄、屏東及臺南，主產期為12月～翌年2月，近年來由於新品種選育、經營管理改進及網室栽培普遍化，產量與品質逐年提高，且因品種多樣化，產期已可自12月下旬延長至翌年4月上旬。近年因部分地區轉作其他作物或廢園，面積略有下降。本年各主產區已逐漸進入開花著果期，多數產區受颱風影響有落花、枝條折損情況，評估產量較上年及常年減少。預估114年收穫面積1,733公頃，與113年1,737公頃相當，較常年1,756公頃略減1%；產量2萬3,855公噸，較113年3萬895公噸減產23%，較常年3萬1,261公噸，亦減產24%。

蔬菜類

一、葉菜類

甘藍收穫面積716公頃，產量3萬4,378公噸，較上月減產5%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。本月宜蘭、臺中及南投等高冷地區二期作甘藍持續採收；彰化、雲林、嘉義及臺南等平地產區因氣溫轉涼進入產季，且據平地產區觀測，本年

接連受風災雨影響，市場蔬菜供給減少，種植面積有較上年增加的趨勢。預估本月收穫面積716公頃，較上月690公頃增加4%；產量為3萬4,378公噸，較上月3萬6,357公噸，減產5%，與112年同期2萬6,696公噸比較，則增產29%。

結球白菜收穫面積126公頃，產量5,847公噸，較上月增產29%。

結球白菜性喜冷涼氣候，葉球生長期尤需冷涼和較大日夜溫差，主產區為彰化及雲林。結球白菜因耐熱品種多元，加上入秋後日夜溫差大適合生長，收穫面積漸增；另據主產區觀測，近期因風災後市場蔬菜供給減少，農民積極復耕，評估收穫面積及產量較上年增加。預估本月收穫面積126公頃，較上月99公頃增加27%；產量為5,847公噸，較上月4,538公噸，增產29%，與112年同期4,329公噸比較，亦增產35%。

青花菜收穫面積71公頃，產量1,162公噸，較上月增產417%；白花椰菜收穫面積177公頃，產量4,981公噸，較上月增產55%。

青花菜及白花椰菜性喜涼爽濕潤氣候，入秋氣溫轉涼適合生長，收穫面積及產量逐漸增加。青花菜主產區為雲林及嘉義等地。預估本月收穫面積

71公頃，較上月12公頃增加481%；產量為1,162公噸，較上月225公噸，增產417%，與112年同期862公噸比較，亦增產35%。

白花椰菜主產區為彰化、嘉義及高雄等地，目前為二期作採收期，因本年種植期間氣候平順，農民種植意願高，整體收穫面積及產量較上年同期增加。預估本月收穫面積177公頃，較上月112公頃增加58%；產量為4,981公噸，較上月3,206公噸，增產55%，與112年同期3,063公噸比較，亦增產63%。

短期葉菜收穫面積583公頃，產量1萬1,617公噸，較上月減產5%。

短期葉菜包含不結球白菜及蕹菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油菜及青梗白菜（青江菜）等，主產區為雲林及桃園。進入秋季後，各產區不結球白菜收穫面積逐漸增加，夏季蔬菜（蕹菜、莧菜）將陸續減少，並轉殖冬季葉菜。預估本月收穫面積583公頃，較上月625公頃減少7%；產量為1萬1,617公噸，較上月1萬2,249公噸，減產5%，與112年同期1萬2,042公噸比較，亦減產4%。

二、瓜果類

胡瓜收穫面積572公頃，產量1,526公噸，較上月減產41%。

胡瓜為連續採收型作物，依果實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜

性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，主產區為屏東、雲林、彰化、高雄等地。本月多數主產區進入採收尾聲，產量逐漸減少，且受到近期風災及降雨影響，植株受損，產期提前結束，評估整體較上年減產。預估本月收穫面積572公頃，產量為1,526公噸，較上月2,565公噸，減產41%，與112年同期產量1,896公噸比較，亦減產20%。

絲瓜收穫面積1,041公頃，產量3,098公噸，較上月減產32%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且可連續採收，主產區為南投、臺南、嘉義、屏東及高雄等地。本月為二期作採收末期，產量逐漸減少，並受凱米颱風影響，田區植株受損，產量較上年減少。預估本月收穫面積1,041公頃，產量為3,098公噸，較上月4,537公噸，減產32%，與112年同期4,052公噸，亦減產24%。

西瓜收穫面積182公頃，產量2,483公噸，較上月減產52%。

西瓜適宜溫暖乾燥且日照充足的環境，本月主產區為臺南、嘉義、高雄及屏東等地。本月為二期作採收末期，以小西瓜為主，北部產區已採收結束，臺南產區則受凱米颱風及9月下旬豪雨影響，收穫面積及產量均減少。預估本月收穫面積182公頃，較上月387公頃

減少53%；產量為2,483公噸，較上月5,152公噸，減產52%，與112年同期2,898公噸比較，亦減產14%。

三、根莖類

青蔥收穫面積408公頃，產量9,296公噸，較上月減產6%。

青蔥依品種不同，對溫度感應及環境條件要求略有差異，主要栽培品種為四季蔥、粉蔥、北蔥及大蔥，主產區為彰化、雲林及宜蘭。中部產區目前氣候平順，農民種植意願提升，預期產量較上年同期增加。預估本月收穫面積408公頃，較上月437公頃，減少7%；產量為9,296公噸，較上月9,894公噸，減產6%，與112年同期7,459噸比較，則增產25%。

花卉類

菊花收穫面積38公頃，產量1,270萬枝，較上月增產11%。

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主產區為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5～9月開花）、秋菊（10～11月開花）及寒菊（12月～翌年1月開花）。但栽培上可利用電照或黑布遮光改變日長調節開花期，以達到周年性生產。天氣轉涼，已進入秋冬菊生產期，加上凱米颱風影響減

弱，本月生長回復，產量增加。預估本月收穫面積為38公頃，較上月37公頃增加3%，與112年同期38公頃相若；本月產量預估為1,270萬枝，較上月1,139萬枝產量增產11%，與112年同期1,195萬枝比較，增產6%。

洋桔梗收穫面積4公頃，產量111萬枝，較上月增產15%。

洋桔梗適宜栽培溫度約為15～25℃間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、嘉義新港及臺南麻豆等鄉鎮。洋桔梗為冬季種植作物，目前進入秋植期，雲林地區種植面積漸增，預估收穫面積及產量略增。預估本月收穫面積為4公頃，較上月3.6公頃增加13%，與112年同期6公頃比較，減少28%；產量為111萬枝，較上月97萬枝增產15%，與112年同期156萬枝比較，減產29%。

火鶴花收穫面積142公頃，產量222萬枝，與上月相若。

火鶴花為多年生草本花卉，多栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。因火鶴花性喜溫暖高濕環境，臺灣氣候適合生長，可進行周年生產，極具外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5～6月

及9~10月，花芽發育初期會經過一段休眠期再繼續發育。本月火鶴花盛產期剛過，產區受凱米颱風影響產量，目前逐漸恢復產能中，評估本月產量持平。預估本月收穫面積142公頃，與上月面積相當，與112年同期128公頃比較，增加11%；產量222萬枝，與上月產量相若，較112年同期264萬枝，減產16%。

文心蘭收穫面積249公頃，產量414萬枝，較上月產量減產10%。

文心蘭屬多年生草本植物，主產區為臺中市后里、新社、北屯、石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，具發展切花外銷優勢。栽培環境多為網室栽培，每年5~6月及9~10月為盛產期。天氣漸轉涼，文心蘭盛產期剛過，評估本月產量減少。預估本月收穫面積249公頃，與上月面積相當，與112年同期255公頃減少2%；產量為414萬枝，較上月462萬枝減產10%，與112年同期384萬枝比較，增產8%。

雜糧類

二期作落花生產量2萬7,772公噸，較常年同期作減產14%。

落花生主產區為雲林、彰化及嘉義等地，一年可種植兩期作。因常與其

他作物輪作，栽培面積常隨輪作作物及前期之價格而變動。113年二期作落花生仍以雲林縣種植面積最多，彰化次之。本年依產地觀測，雲林產區受到7月底凱米颱風影響種植面積，種植面積略減。彰化產區則多為颱風後種植或補植，農友預期收購價格易因颱風提高，種植面積增加。預估113年二期作落花生收穫面積1萬1,069公頃，與112年同期作1萬973公頃比較，增加1%，與常年同期作1萬1,851公頃比較，減少7%；產量2萬7,772公噸，與上年同期作2萬5,791公噸比較，增產8%，與常年同期作產量3萬2,467公噸比較，則減產14%，係本年期落花生生育期間受颱風影響，單位面積產量較常年低所致。

裡作紅豆種植面積4,360公頃，較常年同期作減少24%。

紅豆生產以秋裡作栽培為主，產區集中在屏東、高雄等地，其中又以屏東縣栽培面積最多。依據產區觀測結果，由於種植紅豆農戶，一期作多以種植稻作為主，本年期因9月多雨及10月山陀兒颱風影響發芽及農友翻耕作業，部分農友為避免紅豆採收期延後，影響一期稻作種植，本期種植紅豆意願降低。預估114年裡作種植面積4,360公頃，與113年同期作5,224公頃相較減少17%，較常年面積5,718公頃，減少24%。