

114年4月主要農作物生產預測

撰文 | 農糧署 洪思賢、黃崇瑜、林佩慧

果 品 類

香蕉收穫面積1萬4,114公頃，總產量33萬8,762公噸，較常年減產1%；春夏蕉產量17萬9,276公噸，較113年增產10%。

► 預測月份3至6月、8月至翌年1月

香蕉主要產地分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大產區，依採收季節可分為春夏蕉（2月下旬至9月中旬採收）及秋冬蕉（9月下旬至翌年2月上旬採收）。114年綜合各產區觀測結果，部分產區受黃葉病、人口老化等影響略有減少種植面積，部分產區因上年市場價格較佳，面積略有增加，整體面積變動幅度不大；產量部分，相較113年連受凱米、山陀兒及康芮颱風影響，114年產量評估較上年增加。預估114年收穫面積1萬4,114公頃，較113年1萬4,330公頃減少2%，較常年平均1萬4,693公頃減少4%；產量33萬8,762公噸，較113年27萬9,224公噸，因上年基數較低影響，致增產21%，較常年平均340,685公噸，則減產1%。114年春夏蕉預估收穫面積為6,839公頃，較113年7,094公頃減少4%；產量17萬9,276公噸，較113年16萬2,657公噸，則增產10%。

番石榴收穫面積7,853公頃，總產量20萬2,441公噸，較常年增產7%；上半年果產量9萬8,376公噸，較113年增產6%。

► 預測月份3至10月

番石榴為熱帶常綠果樹，周年可開花結實，主產區分布於高雄、臺南、彰化及屏東等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1至6月）及下半年果（7至12月）。番石榴運用不同修剪時期調節生產，以配合市場需求，並可避開6至9月水果盛產期及颱風豪雨季節。番石榴技術門檻較低，惟近年收穫面積增加趨緩；又近5年間110、111、112、113年有乾旱、豪雨、颱風等影響，114年產量評估較上年及常年增加。預估114年收穫面積7,853公頃，與113年7,865公頃相當，與常年平均7,837公頃相當；產量20萬2,441公噸，較113年16萬5,763公噸增產22%，較常年平均18萬9,921公噸，亦增產7%。上半年果預估收穫面積7,853公頃，與113年7,865公頃相當；產量9萬8,376公噸，較113年9萬2,466公噸，則增產6%。

木瓜收穫面積2,522公頃，產量12萬4,767公噸，較常年增產1%；夏果產量7萬1,021公噸，較113年增產4%。

► 每月預測

木瓜為熱帶果樹，主產區為屏東、臺南及南投等縣市，品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可藉由人為疏花疏果進行產期調節，適當調節果實於價高或病害較少的季節產出，因此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3至8月）及冬果（9月至翌年2月）。113年各產區收穫面積變動不大；產量部分，110、111、112、113年受乾旱、豪雨、颱風等影響，114年產量評估較上年及常年增加。預估114年收穫面積2,522公頃，與113年2,531公頃相當，較常年平均2,623公頃減少4%；產量12萬4,767公噸，較113年10萬6,105公噸增產18%，較常年平均12萬3,289公噸，亦增產1%。夏果預估收穫面積2,522公頃，與113年2,531公頃相當；產量7萬1,021公噸，較113年6萬8,065公噸，則增產4%。

鳳梨收穫面積7,034公頃，產量35萬8,447公噸，較常年減產8%。

► 預測月份2至7月

鳳梨主產區分布於屏東、臺南、高雄、嘉義及南投等縣市，栽培品種以台農17號（金鑽）為大宗，主產期為3月至6月，其餘尚有加工用之開英種（土鳳梨）、台農20號（牛奶鳳梨）、台農



16號（甜蜜蜜）、台農22號（西瓜鳳梨）、台農23號（芒果鳳梨）等不同產期之品種。鳳梨自定植至採收約需18個月，自然狀態下產期集中於6月至8月，然因夏季高 多雨易使肉聲果比率上升。為提升果實品質且避免供過於求，並因應消費市場需求或配合鮮果外銷，農民多實施產期調節，於8月至10月進行催花處理生產春果，農糧署也持續推廣不同產期鳳梨品種，調節鳳梨市場供貨時間。鳳梨自110年輪中受阻、農業人口老化及資材成本上漲等因素影響，部分農友種植意願降低；113年部分產區受颱風危害，對隔年植株生育之影響則有待後續觀測，114年評估產量與上年相當。預估114年收穫面積7,034公頃，與113年7,035公頃相當，較常年平均7,447公頃減少6%；產量35萬8,447公噸，與113年35萬7,995公噸相當，較常年平均38萬7,930公噸，則減產8%。

梅收穫面積3,180公頃，產量1萬8,541公噸，較常年增產10%。

► 預測月份2至4月

梅為多年生落葉果樹，主產區為高雄、南投、臺東、臺南、臺中及花蓮等縣市之中低海拔山坡地，產期為每年3月下旬至5月下旬。為健全梅產業發展，農糧署持續輔導竿採梅農友與加工場契作，並對有競爭力地區輔導轉型為手採梅。近5年收穫面積受人口老化等因素影響，有逐年下降趨勢；相較於110、112、113年有雨水短缺、低溫累積不足等情形，114年低溫尚足，開花及結果情形均較上年及常年佳。預估114年收穫面積3,180公頃，較113年3,232公頃減少2%，較常年平均3,360公頃減少5%；產量1萬8,541公噸，較113年1萬3,435公噸增產38%，較常年平均1萬6,884公噸，亦增產10%。

梨收穫面積4,827公頃，產量8萬4,394公噸，較常年減產12%。

► 預測月份2至4月

臺灣梨可分為高需冷性溫帶梨，如豐水、新世紀、新興、幸水、新雪梨等，低需冷性梨，如橫山、晶圓、蜜雪梨等，及高接梨，以優良溫帶梨品種之花芽，經滿足低溫需求後作為接穗。溫帶梨主產區為臺中市和平區，於4月上旬開花，8月至11月收穫；高接梨主產區為臺中市東勢區、

苗栗縣卓蘭鄉等，於12至2月間嫁接，5至8月收穫。114年高接梨主產縣市受1-2月低溫影響，有授粉不佳、重新嫁接之情形，惟113年亦有1月下旬寒流造成危害，114年評估產量與上年相當，後續仍需持續觀測重新嫁接後生育情形。預估114年收穫面積4,827公頃，與113年4,847公頃相當，較常年平均4,930公頃減少2%；產量8萬4,394公噸，與113年產量8萬4,241公噸相當，較常年平均9萬6,343公噸，則減產12%。

本地種芒果收穫面積2,304公頃，產量1萬2,529公噸，較常年減產20%。

► 預測月份4至6月

本地種芒果俗稱土檬果、柴檬、土檬仔，主產區分布於屏東、臺南及高雄等縣市，以屏東縣收穫面積最多，主要產期為3至5月。本地種芒果果實不大，惟酸甜風味十足且香氣濃郁，深受消費者喜愛，其幼果可供製作情人果，成熟果可製作蜜餞、芒果干、冰沙及芒果汁等加工產品。近年部分產區有廢園面積增加情形，亦有部分田區轉作改良種芒果等作物，面積略有減少；114年受1-2月低溫影響及部分園區管理較為粗放，有著果不良情況，評估產量較上年減少。預估114年收穫面積2,304公頃，與113年2,307公頃相當，較常年2,370公頃減少3%；產量1萬2,529公噸，較113年1萬5,186公噸減產17%，較常年1萬5,709公噸，亦減產20%。

改良種芒果收穫面積1萬3,738公頃，產量14萬3,710公噸，較常年增產1%。

► 預測月份4至7月

改良種芒果栽培品種以愛文最多，金煌次之，凱特、海頓及玉文等其他品種栽培面積較少。主產區分布於臺南、屏東及高雄等縣市，其中又以臺南市種植面積最多，約占全臺改良種芒果種植面積50%。各地產期略有差異，屏東地區主要產期為5至6月，臺南地區約為6月中旬至8月，透過栽植不同品種或產期調節，可提早或延後產期，使4至10月皆有芒果可供應市場。113年多數產區因開花參差或受年初連續低溫、降雨等影響，造成開花結果不佳、酥花等情形；114年部分產區亦遭遇1-2月低溫，評估產量相對上年增加，惟實際產量仍須持續觀察實際生理落果及農友疏果、套袋後生育情形。預估114年收穫面積1萬3,738公頃，與113年1萬3,796公頃相當，與常年1萬3,746公頃相當；產量14萬3,710公噸，較113年11萬6,687公噸增產23%，較常年14萬2,169公噸，則增產1%。

荔枝收穫面積9,458公頃，產量6萬6,335公噸，較常年增產14%。

► 預測月份4至6月

荔枝為亞熱帶常綠果樹，栽培品種以黑葉為最多，其次為早熟種玉荷包，另有部分栽培地方品種或新育成品種。主產區為高雄、臺中、南投及臺南等縣

市，主要產期為5至8月。荔枝種植面積近年受天然災害、蟲害及務農人口老化等影響，面積逐漸減少；又110年遭遇高溫乾旱、111年低溫降雨致授粉不良、113年受氣溫高低變化影響花芽分化等原因，造成近5年間平均產量波動較大，114年各產區開花情形尚佳，評估產量較上年及常年增加，惟荔枝開花至果實發育期間易受氣候影響，將持續觀測後續生理落果及果實發育情形。預估114年收穫面積9,458公頃，較上年9,516公頃略減1%，較常年9,610公頃減少2%；產量6萬6,335公噸，較上年4萬6,802公噸增產42%，較常年5萬8,009公噸，則增產14%。

葡萄(夏果)收穫面積2,166公頃，產量4萬2,843公噸，較常年增產3%。

► 預測月份夏果4、5月；冬果10、11月

葡萄為多年生溫帶果樹，主產區為彰化、臺中、苗栗及南投。葡萄產期調節技術發達，最普遍的栽培模式為6至7月生產夏果及12至1月生產冬果之一年二收模式，另有利用溫室設施栽培生產3至5月早春葡萄或僅收夏果等一年一收栽培模式，葡萄(夏果)預測則包含早春葡萄或夏果。臺灣葡萄栽培品種以鮮食葡萄巨峰為主，與進口葡萄具區隔性，惟葡萄雖具高經濟價值，因栽培技術門檻高，耗費勞力且易受氣候影響，近年有廢園及轉作其他作物之趨勢，種植面積較常年減少。113年部分產區受2月低溫

及4月下旬豪雨影響，有授粉不良、假性結果等情況，114年彰化產區早春葡萄產量正常，已陸續產出，整體產量較上年及常年增加。預估114年收穫面積

2,166公頃，與113年2,176公頃相當，較常年2,258公頃減少4%；產量4萬2,843公噸，與113年3萬9,367公噸增產9%，較常年4萬1,503公噸，則增產3%。

蔬菜類

一、葉菜類（每月預測）

甘藍收穫面積496公頃，產量2萬5,261公噸，較上月減產31%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。本月主產區仍為彰化和雲林等地區，平地產區一期作水稻陸續種植，預估收穫面積及產量較上月大幅減少；另受前期低溫影響，高山產區有延後種植及生育期趨緩情形，致可收穫面積及產量亦較上年同期減少。預估本月收穫面積496公頃，較上月716公頃減少31%；產量為2萬5,261公噸，較上月3萬6,502公噸減產31%，與上年同期2萬8,208公噸比較，亦減產10%。

結球白菜收穫面積59公頃，產量2,727公噸，較上月減產48%。

結球白菜喜冷涼氣候，葉球生長期尤需冷涼和較大日夜溫差。主產區為彰化及雲林等地。本月氣溫將逐漸回升，冬季適栽品種多於上月完成採收，且時序進入春季播種期，預估收穫面積及產量會逐漸減少。預估本月收穫面積59公頃，較上月107公頃減少

45%；產量為2,727公噸，較上月5,259公噸減產48%，與上年同期2,806公噸比較，亦減產3%。

青花菜收穫面積102公頃，產量2,056公噸，較上月減產50%；白花椰菜收穫面積102公頃，產量2,844公噸，較上月減產34%。

青花菜及白花椰菜喜涼爽濕潤氣候，本月起漸不適合生育，整體收穫面積及產量將逐漸減少。青花菜主產區為雲林及嘉義等地。本年因加工用品種契作面積減少，致可收穫面積較上年同期減少。預估本月收穫面積102公頃，較上月206公頃減少50%；產量為2,065公噸，較上月4,163公噸減產50%，與上年同期2,658公噸比較，亦減產22%。

本月白花椰菜主產區為彰化及高雄等地，目前各產區採收後，開始一期作水稻插秧，可收穫面積及產量將逐漸減少，本年彰化產區因人口老化，勞動力減少，部分田區改種水稻，及高雄產區部分田區休耕，致可收穫面積較去年同期減少。預估本月收穫面積102公頃，

較上月148公頃減少31%；產量為2,844公噸，較上月4,283公噸減產34%，與上年同期3,496公噸比較，亦減產19%。

短期葉菜收穫面積527公頃，產量1萬582公噸，較上月減產5%。

短期葉菜包含不結球白菜及薺菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油菜及青梗白菜（青江菜）等。本月主產區為雲林及桃園等地，目前氣溫偏涼，露天栽種仍以生產不結球白菜為主，設施栽種則陸續轉植夏季蔬菜（薺菜、莧菜等）。預估本月收穫面積527公頃，較上月550公頃減少4%；產量為1萬582公噸，較上月1萬1,105公噸減產5%，與上年同期1萬997公噸比較，亦減產4%。

二、瓜果類（每月預測）

胡瓜收穫面積434公頃，產量3,201公噸，較上月減產18%。

胡瓜為連續採收型作物，依果實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，主產區為屏東、高雄、彰化及雲林等地，目前為一期作生產期，產量較上月減少。本年屏東產區部分田區轉作茄子或休耕，彰化產區則因田區病蟲害問題影響農民種植意願，致可收穫面積較上年同期減少。預估本月收穫面積434公頃，產量為3,201公噸，較上月3,916公噸減產18%，與上年同期3,584公噸比較，亦減產11%。

絲瓜收穫面積1,090公頃，產量5,642公噸，較上月增產66%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且可連續採收，主產區為臺南、屏東、高雄及彰化等地，目前南部產區持續採收中，南投及嘉義產區一期作亦開始採收，致產量較上月大幅增加。預估本月收穫面積1,090公頃，產量為5,642公噸，較上月2,450公噸增產130%，與上年同期5,556公噸比較，亦增產2%。

西瓜收穫面積396公頃，產量6,281公噸，較上月增產49%。

西瓜適宜溫暖乾燥且日照充足的環境，本月主產區為臺南、高雄及屏東等地，目前高雄及屏東產區持續採收，臺南產區開始採收，預估收穫面積及產量較上月大幅增加；另各主產區均表示，本年氣候低溫期較往年長，導致西瓜生長期延後，可收穫面積較上年同期減少。預估本月收穫面積396公頃，較上月272公頃增加46%；產量為6,281公噸，較上月4,210公噸增產49%，與上年同期8,335公噸比較，則減產25%。

三、根莖類

青蔥收穫面積293公頃，產量7,090公噸，較上月減產2%。

► 每月預測

青蔥依品種不同，對溫度感應及環境條件要求略有差異，主要栽培品種為四季蔥、粉蔥、北蔥及大蔥，主產區

為彰化、雲林及宜蘭。本月為一期作採收初期，因宜蘭產區前期蔥苗供給不足及彰化產區受低溫影響農民種植意願，致可收穫面積及產量較上年同期減少。預估本月收穫面積293公頃，較上月289公頃增加1%；產量為7,090公噸，較上月7,215公噸減產2%，與上年同期8,741公噸比較，亦減產19%。

一期作薑收穫面積761公頃，總產量2萬7,587公噸，較上年同期減產3%。

► 預測月份3至7月

薑為宿根性多年生草本植物，食用部位為其根莖，喜溫暖氣候，主產區為南投、臺東、臺中及苗栗等地。2月起各地陸續種植，各產區多因異地種植、山區水源不穩及人口老化等因素，種植面積略減，目前氣候穩定，未受上年風災影響，預估產量可恢復正常水準。預估本年一期作收穫面積761公頃，較上年同期807公頃減少6%，與常年同期比較亦減少7%；產量2萬7,587公噸，較上年同期2萬8,582公噸減產3%，與常年同期2萬5,006公噸比較，則增產10%。

裡作大蒜收穫面積5,057公頃、產量4萬8,090公噸，較上年及常年減產3%。

► 預測月份1至5月

大蒜主產區集中於雲林縣，占總產量9成以上，其次為臺南市、彰化縣

及嘉義縣等地亦有少量生產。目前彰化產區的和美早蒜即將進入採收階段，而雲林等地的大片黑蒜將於本月中下旬起採收。在種植初期，因受到113年山陀兒及康芮颱風影響，部分地區出現蒜種泡水腐爛，以及剛出土的葉片受強風吹襲後乾枯、折斷等情形。經各基層公所現地勘查及巡迴觀測，預估種植面積5,057公頃，較上年同期5,333公頃，減少5%；較常年平均5,216公頃，減少3%。目前氣候條件良好，預期單位面積產量有望恢復至常年水準，但確切產量仍需在採收前進行坪割確認。預測總產量為4萬8,090公噸，較上年同期之4萬9,475公噸減產3%；與常年平均4萬9,687公噸比較，亦減產3%。

裡作洋蔥收穫面積1,274公頃、產量6萬893公噸，較上年減產28%，與常年相若。

► 預測月份1至4月

洋蔥主產區為屏東縣、彰化縣、雲林縣及高雄市等地區，產區常隨著製作業主及農民意願而有所消長，本年期種植面積經主產區觀測，受到113年康芮颱風影響，洋蔥苗圃受強風吹襲乾枯死亡，造成洋蔥苗供應不足。預測收穫面積1,274公頃，較上年同期1,669公頃減少24%，較常年平均1,286公頃減少1%；產量部分，因種植面積減少，總產量為6萬893公噸，較上年8萬4,538公噸減產28%，與常年平均6萬811公噸相當。

花卉類

菊花收穫面積36公頃，產量1,202萬枝，較上月產量減產1%。

► 每月預測

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主產區為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5至9月開花）、秋菊（10至11月開花）及寒菊（12至翌年1月開花）。近年因菊花品種權問題，適合冬季種植之品種多具專利權，加上種植技術門檻及人力不足等問題，產區漸轉種夏菊。本年經田區踏勘發現，農民因人力關係種植面積漸減。預估本月收穫面積為36公頃，較上月36公頃略減1%，較上年同期39公頃減少8%；預估本月產量為1,202萬枝，較上月1,219萬枝減少1%，較上年同期1,302萬枝減產8%。

洋桔梗收穫面積3.5公頃，產量95萬枝，較上月產量減產22%。

► 每月預測

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏15至25度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、嘉義新港及臺南麻豆等鄉鎮。目前進入春播期，可收穫面積及總體產量減少。預估本月可採收面積為3.5公頃，較上月4.5公頃減

少23%，較上年同期3.7公頃減少6%；預估本月產量為95萬枝，較上月123萬枝減產22%，較上年同期105萬枝減產9%。

火鶴花收穫面積142公頃，產量252萬枝，較上月產量增產18%。

► 每月預測

火鶴花為多年生草本花卉，主要栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。由於火鶴花性喜溫暖高濕環境，臺灣氣候適合生長，可進行周年生產，且具有外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5-6月及9-10月，花芽發育初期會經過一段休眠期後方能繼續生長。火鶴花盛產期為5-6月，近來天氣漸暖，各產區表示單位產量均較上個月增加。預估本月收穫面積142公頃，與上月面積相當，較上年同期130公頃增加9%；預估本月產量為252萬枝，與上月產量214萬枝增加18%，較上年同期254萬枝減產1%。

文心蘭收穫面積252公頃，產量385萬枝，較上月產量減產1%。

► 每月預測

文心蘭屬多年生草本植物，主產區集中於臺中市后里、新社、北屯、石

岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，並具備切花外銷的發展優勢。栽培環境以網室栽培為主，每年5-6月及9-10月為盛產期。本月非文心蘭盛產期，台中產區

1-2月受到持續低溫影響花量，評估本月產量略減。預估本月收穫面積252公頃，與上月面積相當，較上年同期253公頃減少1%；預估本月產量為385萬枝，較上月產量389萬枝減產1%，較上年同期420萬枝亦減產8%。

雜糧類

一期作甘藷種植面積較上年同期作減少 3%。

► 預測月份 4、6 月

臺灣地區因氣候溫暖，各地均可全年種植甘藷，栽培季節可分為裡作及一、二期作，主產區以雲林、彰化、臺中、臺南、屏東及嘉義等縣市最多。其用途早期為人類的輔助食糧及家畜的混合飼料，近年則以鮮食為主，部分用於食品加工，被視為膳食纖維食品，廣受消費者青睞。

一期作甘藷生產主要分布於雲林、彰化、臺中、苗栗等地區。據產地觀測，近期因產地價格較上年同期低迷，加上綠色環境基本給付計畫的推廣，部分農民選擇轉作硬質玉米等其他作物，種植面積略減。整體預估

114年一期作甘藷種植面積為1,813公頃，較上年同期的1,878

公頃減少3%，相較於常年同期作1,912公頃亦減少5%。

一期作落花生種植面積較上年同期作減少 4%。

► 預測月份 4、6 月

落花生主產區為雲林、彰化及嘉義等地區，一年可種植兩期作。由於常與其他作物輪作，栽培面積會因輪作作物的選擇及前期之價格波動而有所變動。

近年來，落花生市場需求穩定，但一期作的採收期易受到梅雨或豪雨影響，進而影響品質與農民的種植意願；再經產地觀測，因113年二期作落花生受颱風影響導致減產，種子供應量不足，再加上綠色環境基本給付計畫的推廣，部分農民轉作硬質玉米、毛豆等其他作物，種植面積略減。整體預估114年一期作落花生種植面積5,470公頃，較上年同期作種植面積5,697公頃減少4%，與常年同期作6,006公頃比較，亦減少9%。🌱

