

114年12月主要農作物生產預測

撰文 | 農糧署 黃崇瑜、劉維凱、郭素真

果 品 類

香蕉收穫面積1萬3,835公頃，總產量27萬4,290公噸，較常年減產19%；秋冬蕉產量11萬9,365公噸，較113年增產6%。

► 預測月份3至6月、8月至翌年1月

香蕉主要產地分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大產區，依採收季節可分為春夏蕉（2月下旬至9月中旬採收）及秋冬蕉（9月下旬至翌年2月上旬採收）。114年綜合各產區觀測結果，除受黃葉病、人口老化等影響外，113年連續多個颱風，田區受損嚴重，亦影響種植意願，整體面積較113年及常年平均減少；產量部分，113年受多個颱風影響，114年亦遭遇丹娜絲及楊柳颱風等影響，評估產量較113年再有減少。預估114年收穫面積1萬3,835公頃，較113年1萬4,333公頃減少3%，與常年平均1萬4,693公頃比較，亦減少6%；產量27萬4,290公噸，較113年27萬9,348公噸減產2%，與常年平均34萬685公噸比較，亦減產19%。114年秋冬蕉預估收穫面積為7,147公頃，較113年7,338公頃減少3%；產量11萬9,365公噸，較113年11

萬3,118公噸增產6%。

番荔枝收穫面積4,872公頃，總產量2萬7,133公噸，較常年減產26%；冬果產量2萬165公噸，較113年增產53%。

► 預測月份6至8月、11月至翌年1月

番荔枝為熱帶常綠果樹，主產區為臺東縣，占全臺總種植面積9成以上，栽植品種主要為「釋迦」（俗稱大目釋迦）及「鳳梨釋迦」，種植面積約占各半。大目釋迦透過修剪1年可收夏果及冬果2期，夏果主產期7月至9月、冬果12月至隔年3月。鳳梨釋迦在臺灣多只收冬果，以夏季修剪配合夜間燈照調整產期為12月至隔年4月，避開夏果採後裂果的情形。受廢園及轉作政策影響，114年番荔枝種植面積較113年及常年平均減少；產量部份，113年受多個颱風接連侵襲，果樹多有受損；本年雖有楊柳颱風導致葉片受損、折枝等情形，惟損害程度相對輕微，評估產量較113年增加、較常年平均減少。預估114年收穫面積4,872公頃，較113年4,989公頃減少2%，與常年平均5,271公頃比



較，亦減少8%；產量2萬7,133公噸，較113年1萬8,402公噸增產47%，與常年平均3萬6,504公噸比較，則減產26%。冬果預估收穫面積4,872公頃，較113年4,989公頃減少2%；產量2萬165公噸，較113年1萬3,144公噸增產53%。

木瓜收穫面積2,472公頃，產量10萬2,565公噸，較常年減產17%；冬果產量4萬1,917公噸，較113年增產12%。

► 每月預測

木瓜為熱帶果樹，主產區為屏東、臺南及南投等縣市，品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可藉由人為疏花疏果進行產期調節，適當調節果實於價高或病害較少的季節產出，因此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3至8月）及冬果（9月至翌年

2月）。114年各產區收穫面積較113年變動不大；產量部分，受113年下半年多個颱風影響，114年再受年初低溫及颱風、豪雨影響，評估產量再有減少。預估114年收穫面積2,472公頃，較113年2,505公頃減少1%，與常年平均2,623公頃比較，亦減少6%；產量10萬2,565公噸，較113年10萬5,611公噸減產3%，與常年平均12萬3,289公噸比較，亦減產17%。冬果預估收穫面積2,472公頃，較113年2,505公頃減少1%；產量4萬1,917公噸，較113年3萬7,400公噸增產12%。

柳橙收穫面積4,636公頃，產量8萬7,565公噸，較常年減產28%。

► 預測月份9至12月

柳橙為亞熱帶常綠果樹，主產區為臺南、雲林、嘉義及南投等縣市，

主產期為11月至翌年1月。柳橙樹勢強健，對環境抗性強，具1年可生長3 - 4次梢之特性，早期栽培面積快速增加，近年受農業人口高齡化、園區粗放管理或廢園等影響，種植面積有逐年減少趨勢。產量部分，113年受凱米等多個颱風影響，114年再有丹娜絲颱風，導致響植株倒折、落果等情形，評估產量再有減少。預估114年收穫面積4,636公頃，較113年4,595公頃增加1%，與常年平均4,805公頃比較，則減少4%；產量8萬7,565公噸，較113年9萬8,246公噸減產11%，與常年平均12萬1,178公噸比較，亦減產28%。

桶柑收穫面積2,893公頃，產量4萬4,349公噸，較常年減產11%。

► 預測月份10至12月

桶柑為甜橙及寬皮柑之天然雜交種，栽培品系以普通桶柑、大春種桶柑及由桶柑變異之海梨柑最多。主產區為新竹、苗栗、臺中等地淺山丘陵地帶，主要產期為1至2月。桶柑有隔年結果現象，透過適當的修剪及肥培管理，可減緩此現象。114年除了臺東產區因果園人力老化廢耕及113年康芮颱風侵襲，造成折枝倒伏，致收穫面積減少外，其餘產區變動不大；產量部分，本年各產區均受不同類型的氣候因素影響，例如低溫導致授粉不良、強風導致落果、高溫導致果皮黃（褐）化等，評估整體產量較113年及常年減少。預估114年收

穫面積2,893公頃，與113年2,906公頃相當，與常年平均2,960公頃比較，則減少2%；產量4萬4,349公噸，較113年4萬7,051公噸減產6%，與常年平均4萬9,792公噸比較，亦減產11%。

金柑收穫面積211公頃，產量2,195公噸，較常年減產9%。

► 預測月份11至12月

金柑為亞熱帶常綠果樹，栽培品種以長實金柑為主，因果色金黃美麗，又稱金棗。主要栽培地區為宜蘭縣，約占全臺金柑種植面積逾90%，主產期為11月至翌年2月。金柑除鮮食外亦可作為蜜餞加工原料，提高產品價值及農民收益，惟該產業受經營者老化、山區管理不易、野生動物危害等因素，近年收穫面積逐漸減少。113年受多個颱風影響，有落果、枝條折損等嚴重減產情況；本年亦受10月豪雨及鳳凰颱風影響，評估產量較上年增加，較常年減少。預估114年收穫面積211公頃，較



113年215公頃減少2%，與常年平均229公頃比較，亦減少8%；產量2,195公噸，較113年1,990公噸增產10%，與常年平均2,416公噸比較，則減產9%。

茂谷柑收穫面積1,788公頃，產量30,483公噸，較常年減產12%。

► 預測月份11月至翌年1月

茂谷柑為亞熱帶常綠果樹，主產區為臺中、雲林、嘉義、新竹及苗栗，主產期為翌年1至2月。茂谷柑有隔年結果現象，透過適當的肥培管理及修剪，可減緩此現象，另適當的水分管理，也可避免裂果。本年雲林及嘉義產區因經營者年齡老化，園區疏於管理或轉作其他作物，導致種植面積略減；產量部分，由於北部產區受年初低溫及降雨影響開花著果，以及中南部產區受丹娜斯颱風導致折枝、落果等減產情形，評估產量較113年及常年減少。預估114年收穫面積1,788公頃，較113年1,841公頃減少3%，與常年平均1,851公頃比較，亦減少3%；產量3萬483公噸，較113年3

萬2,579公噸減產6%，與常年平均3萬4,561公噸比較，亦減產12%。

棗收穫面積1,715公頃，總產量2萬8,811公噸，較常年減產3%。

► 預測月份11至12月

棗為熱帶常綠果樹，主產區為高雄、屏東及臺南，主產期為12月至翌年2月。近年來由於新品種選育、經營管理改進及網室栽培普遍化，產量與品質逐年提高，且因品種多樣化，產期已可自12月下旬延長至翌年4月上旬。近年因部分地區轉作其他作物或廢園，面積略有下降。本年各主產區已進入開花著果期，相較於114年期開花著果時受多個颱風影響，導致落花落果而減產，目前氣候穩定評估產量可較114年增加。預估115年收穫面積1,715公頃，較114年1,724公頃減少1%，與常年平均1,740公頃比較，亦減少1%；產量2萬8,811公噸，較114年2萬2,392公噸增產29%，與常年平均2萬9,618公噸比較，則減產3%。

蔬菜類

一、葉菜類（每月預測）

甘藍收穫面積1,168公頃，產量5萬4,984公噸，較上月增產28%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。本月氣候涼冷，宜蘭、

臺中及南投等高冷地區甘藍進入產季尾聲，平地產區則進入盛產期，主產區為彰化、雲林、嘉義及臺南等地。據平地產區觀測，本年種植期受颱風、豪雨及高溫等不利氣候影響，甘藍生長不

易，農民多延後種植，並於本月陸續採收，整體收穫面積及產量較上月及上年同期增加。預估本月收穫面積1,168公頃，較上月866公頃增加35%；產量5萬4,984公噸，較上月4萬2,826公噸，增產28%，與上年同期3萬7,797公噸比較，亦增產45%。

結球白菜收穫面積140公頃，產量6,701公噸，較上月增產47%。

結球白菜性喜冷涼氣候，葉球生長期尤需冷涼和較大日夜溫差。本月氣候早晚溫差大，適宜結球白菜生長，主產區為雲林、彰化、宜蘭及嘉義等地，目前為裡作採收初期，收穫面積及產量較上月增加。預估本月收穫面積140公頃，較上月102公頃增加37%；產量6,701公噸，較上月4,573公噸，增產47%，與上年同期6,677公噸相當。

青花菜收穫面積213公頃，產量3,449公噸，較上月增產225%；白花椰菜收穫面積227公頃，產量5,911公噸，較上月增產48%。

青花菜及白花椰菜性喜涼爽濕潤氣候，入秋後氣溫轉涼適合生長，收穫面積及產量明顯增加。本月青花菜進入裡作採收期，主產區為雲林及嘉義。預估本月收穫面積213公頃，較上月69公頃增加208%；產量3,449公噸，較上月1,063公噸，增產225%，與上年同期3,118公噸

比較，亦增產11%，係因雲林產區契作面積增加所致。

白花椰菜主產區為彰化及高雄，本月進入裡作採收初期，收穫面積及產量較上月增加。預估本月收穫面積227公頃，較上月156公頃增加45%；產量5,911公噸，較上月3,987公噸，增產48%，與上年同期5,762公噸比較，亦增產3%。

短期葉菜收穫面積617公頃，產量1萬2,420公噸，較上月增產8%。

短期葉菜包含不結球白菜及薤菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油菜及青梗白菜（青江菜）等，主產區為雲林及桃園。進入秋冬季後，各產區以種植不結球白菜為主，夏季蔬菜（薤菜、莧菜）僅零星栽培，並轉作冬季葉菜。預估本月收穫面積617公頃，較上月577公頃增加7%；產量1萬2,420公噸，較上月1萬1,489公噸，增產8%，與上年同期1萬2,299公噸比較，略增1%。

二、瓜果類（每月預測）

胡瓜收穫面積416公頃，產量2,047公噸，較上月增產8%。

胡瓜為連續採收型作物，依果實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產。本月主產區為屏東、高雄、彰化及臺南。南投、雲林及嘉義等地二期作胡瓜已於上月採收完畢，致整體收穫面積較上月減少。惟屏東

及高雄產區上年受颱風及豪雨影響，產量銳減，而本年入秋後氣候較為穩定，且於本月進入裡作採收初期，致整體產量較上月及上年同期增加。預估本月收穫面積416公頃，較上月641公頃減少35%；產量2,047公噸，較上月1,896公噸，增產8%，與上年同期1,609公噸比較，亦增產27%。

絲瓜收穫面積505公頃，產量853公噸，較上月減產73%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且可連續採收。本月主產區為屏東、臺南及彰化，目前為二期作採收末期；另南投、雲林及嘉義產區已於上月採收完畢，評估整體收穫面積及產量較上月大幅減少。預估本月收穫面積505公頃，較上月1,036公頃減少51%；產量853公噸，較上月3,108公噸，減產73%，與上年同期903公噸比較，亦減產6%。

西瓜收穫面積165公頃，產量2,685公噸，較上月減產18%。

西瓜適宜溫暖乾燥且日照充足的環境，本月主產區為屏東、高雄、嘉義及臺南。除嘉義產區部分河川地種植大西瓜外，其餘產區以種植小西瓜為主。預估本月收穫面積165公頃，較上月265公頃減少38%；產量2,685公噸，較上月3,258公噸，減產18%，係因臺南產區二期作西瓜已進入採收尾聲所致，若與上年同期1,750公噸比較，則增產

53%，係因屏東產區上年受山陀兒颱風影響，產量銳減，而本年氣候影響相對較小所致。

三、根莖類

青蔥收穫面積392公頃，產量9,020公噸，較上月減產4%。

► 每月預測

青蔥依品種不同，對溫度感應及環境條件要求略有差異，主要栽培品種為四季蔥、粉蔥、北蔥及大蔥，主產區為彰化、雲林及宜蘭。預估本月收穫面積392公頃，較上月425公頃減少8%；產量9,020公噸，較上月9,393公噸，減產4%，若與上年同期8,278公噸比較，則增產9%，係因雲林產區上年受颱風及豪雨影響多處田區積水，造成青蔥黃化、腐爛情形嚴重，而本年入秋後氣候較為穩定，致整體產量較上年同期增加。

裡作蘿蔔收穫面積1,404公頃，產量4萬1,633公噸，較上年減產6%，較常年減產23%。

► 預測月份：12月至翌年3月

蘿蔔性喜冷涼氣候，具半耐寒性而不耐熱，適合於秋冬季栽培。本年裡作蘿蔔主產區為彰化、雲林及高雄等地。除高雄、彰化及臺東產區種植面積增加外，其餘產區多因轉（契）作其他作物及配合政策休耕等因素，種植面積較上年同期及常年減少。預估

本（114/115）年裡作收穫面積1,404公頃，較上年同期1,435公頃減少2%，與常年平均1,604公頃比較，亦減少12%；

產量4萬1,633公噸，較上年同期4萬4,200公噸，減少6%，與常年平均5萬3,941公噸比較，亦減少23%。

花卉類

菊花收穫面積36公頃，產量1,091萬枝，較上月增產16%。

► 每月預測

菊花為1年或多年生草本，屬短日照植物，主產區為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5至9月開花）、秋菊（10至11月開花）及寒菊（12至翌年1月開花）。但栽培上可利用電照或黑布遮光改變日長調節開花期，以達到周年性生產。天氣轉涼，已進入秋冬菊生產期，評估可收穫面積及產量增加。預估本月收穫面積為36公頃，較上月32公頃增加13%，較113年同期39公頃，減少7%；產量為1,091萬枝，與上月941萬枝比較增產16%，較113年同期1,208萬枝，則減產10%。

洋桔梗收穫面積5.7公頃，產量147萬枝，較上月增產59%。

► 每月預測

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏15至25度間，由於花型和花色豐富多樣，近

年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、雲林縣北港、虎尾、嘉義新港及臺南麻豆等鄉鎮。洋桔梗為冬季種植作物，本月進入秋植季節，單位面積產量漸增，評估產量增加。預估本月收穫面積為5.7公頃，較上月3.6公頃增加56%，較113年同期4.6公頃，增加24%；產量為147萬枝，與上月92萬枝比較增產59%，較113年同期127萬枝，亦增產16%。

火鶴花收穫面積142公頃，產量222萬枝，較上月減產3%。

► 每月預測

火鶴花為多年生草本花卉，多栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。因火鶴花性喜溫暖高濕環境，臺灣氣候適合生長，可進行周年生產，極具外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5–6月及9–10月，花芽發育初期會經過一段休眠期再繼續發育。本月非火鶴花主產期，時序漸入秋冬氣溫明顯降低，單位產量

較上月減產，評估本月產量略減。預估本月收穫面積142公頃，與上月及113年同期面積相當；產量為222萬枝，與上月230萬枝比較減產3%，較113年同期219萬枝，則略增2%。

文心蘭收穫面積257公頃，產量372萬枝，較上月減產11%。

► 每月預測

文心蘭屬多年生草本植物，主產區為臺中市后里、新社、北屯、石岡、

雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，具發展切花外銷優勢。栽培環境多為網室栽培，每年5-6月及9-10月為盛產期。天氣漸轉涼，文心蘭盛產期剛過，評估本月產量減少。預估本月收穫面積257公頃，與上月面積相當，較113年同期249公頃，增加3%；產量為372萬枝，與上月416萬枝比較減產11%，較113年同期406萬枝，亦減產8%。

雜糧類

裡作甘藷種植面積3,969公頃，較去年同期作增加13%。

► 預測月份12月、翌年2月

國內裡作甘藷主要分布於中南部雲林、彰化及臺南等縣市，尤以雲林縣生產面積最大，臺南市次之。裡作甘藷之栽培多與一、二期水稻輪作，並配合稻作產期調整種植期間。近年甘藷種植面積受政府推動大糧倉計畫，推廣種植轉（契）作甘藷並設置集團產區，契作價格及種植面積相對穩定。除受相關政策影響外，主產區多與農民團體或農企業主體配合以契作方式生產，亦受其預估需求而調整種植面積。至未參與契作之農戶，其種植意願隨種植品種品質及價格而有所調整。

依據主產區觀測結果，近年甘藷市場需求旺，致114年產地價格相對較佳，提升農民種植意願，預估115年裡作種植面積3,969公頃，較114年同期作3,890公頃增加2%，與常年同期作3,500公頃比較，亦增加13%。🌱

