

115年7月主要農作物生產預測

撰文 | 農糧署 劉維凱、張家維

果 品 類

番荔枝收穫面積4,851公頃，總產量3萬6,216公噸，較常年增產35%；夏果產量9,980公噸，較114年增產91%。

► 預測月份6至8月、11月至翌年1月

番荔枝為熱帶常綠果樹，主產區為臺東縣，占全臺總種植面積9成以上，栽植品種主要為「釋迦」（俗稱大目釋迦）及「鳳梨釋迦」，兩者種植面積約占各半。大目釋迦透過修剪，1年可收夏果及冬果2期，夏果主產期7至10月、冬果12月至翌年4月。

鳳梨釋迦在臺灣多只收冬果，透過夏季修剪及夜間燈照調整產期為12月至翌年4月，避開夏果採後裂果情形。115年番荔枝收穫面積受鳳梨釋迦廢園及轉作政策推動影響，較常年平均減少；產量部分，相較於112年受海葵颱風、113年受康芮颱風及114年受楊柳颱風影響，造成落果、葉片受損及植株倒伏等災情，致產量減少；本年目前氣候尚屬穩定，若後續未受不利氣候影響，評估產量較上年及常年平均增加。



預估115年收穫面積4,851公頃，與114年4,841公頃相當，較常年平均5,121公頃減少5%；產量3萬6,216公噸，較114年2萬1,690公噸增產67%，與常年平均2萬6,909公噸比較，亦增產35%。115年夏果預估收穫面積4,851公頃，與114年4,841公頃相當；產量9,980公噸，較114年5,212公噸，增產91%。

115年番石榴收穫面積7,904公頃，總產量20萬1,296公噸，較常年增產11%；下半年果產量10萬3,362公噸，較114年增產25%。

► 預測月份3至10月

番石榴為熱帶常綠果樹，周年可開花結實，主產區為高雄、彰化、臺南及屏東等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1至6月）及下半年果（7至12月）。番石榴利用不同修剪時期調節生產，以配合市場需求，並可避開6至9月水果盛產期及颱風豪雨季節。番石榴技術門檻較低，惟近5年，除111年生產情形較為正常外，其餘年度多受乾旱、豪雨或颱風等不同程度氣候影響產量減少，致收穫面積增加幅度呈減緩趨勢。產量部分，114年受丹娜絲颱風及後續豪雨影響，產量銳減並推升價格，農民因而增加留果量及加強田間管理；本年高屏產區於6月下旬受豪雨影響，部分田區積水，造成落花、落果、腐果增加及根系受損等災情，惟多數產區生育期間氣候相對平順，評估整體產量仍較上年及常年平均增加。

預估115年收穫面積7,904公頃，與114年7,876公頃相當，較常年平均7,852公頃略增1%；產量20萬1,296公噸，較114年17萬1,410公噸增產17%，與常年平均18萬1,258公噸比較，亦增產11%。下半年果預估收穫面積7,904公頃，與114年7,876公頃相當；產量10


萬3,362公噸，較114年8萬2,981公噸，增產25%。

115年木瓜收穫面積2,448公頃，產量11萬7,008公噸，較常年略增1%；夏果產量6萬8,445公噸，較114年增產10%。

► 每月預測

木瓜為熱帶果樹，主產區為屏東、臺南、南投及高雄等縣市，栽培品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可透過人為疏花疏果適當調節產期，使果實於價高或病害較少的季節產出，因此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3至8月）及冬果（9月至翌年2月）。115年各主產區收穫面積較114年變動不大；產量部分，相較於114年受丹娜絲颱風及後續豪雨影響，多數產區發生植株倒伏、落果及根系腐爛等災情，致產量減少；本年高屏產區受6月下旬豪雨影響，造成部分田區積水、葉面破損及果實水傷等災情，惟多數產區生育期間氣候尚屬平順，若後續未再受不利氣候影響，評估整體產量仍較上年增加。

預估115年收穫面積2,448公頃，與114年2,449公頃相當，較常年平均2,565公頃減少5%；產量11萬7,008公噸，較114年10萬1,781公噸增產15%，與常年平均11萬5,712公噸比較，亦略增1%。夏果預估收穫面積2,448公頃，與114年2,449公頃相當；產量6萬8,445



公噸，較114年6萬1,978公噸，增產10%。

115年鳳梨收穫面積6,980公頃，產量36萬6,848公噸，較常年減產2%。

► 預測月份2至7月

鳳梨主產區為屏東、高雄、嘉義、臺南及南投等縣市，栽培品種以台農17號（金鑽）為大宗，主產期為3月至6月，其餘尚有加工用之開英種（土鳳梨）、台農20號（牛奶鳳梨）、台農16號（甜蜜蜜）、台農22號（西瓜鳳梨）、台農23號（芒果鳳梨）等不同產期之品種。鳳梨自定植至採收約需18個月，自然狀態下產期集中於6月至8月，惟因夏季高溫多雨易使肉聲果比率上升，為提升果實品質且避免供過於求，並因應消費市場需求及配合鮮果外銷，農民多實施產

期調節，於8月至10月進行催花處理生產春果，農糧署也持續推廣不同產期鳳梨品種，調節鳳梨市場供貨時間。鳳梨自110年起輸中受阻，加上農業人口老化及資材成本上漲等因素影響，部分農民種植意願下降。產量部分，114年南部產區受年初低溫持續時間較長影響，造成果實偏小及裂果等情形，加以下半年多數產區受丹娜絲颱風及後續豪雨影響，致產量減少；相較之下，本年底溫持續時間較短，且氣候相對穩定，評估整體產量較上年增加。

預估115年收穫面積6,980公頃，與114年6,967公頃相當，較常年平均7,178公頃減少3%；產量36萬6,848公噸，較114年34萬3,827公噸增產7%，若與常年平均37萬3,167公噸比較，則減產2%。

**改良種芒果收穫面積1萬3,697公頃，
產量16萬5,905公噸，較常年增產
34%。**

► 預測月份4至7月

改良種芒果栽培品種以愛文最多，金煌次之，凱特、海頓及玉文等其他品種栽培面積較少。主產區為臺南、屏東及高雄，其中又以臺南市種植面積最多，約占全臺改良種芒果總種植面積50%。各地產期略有差異，屏東地區主要產期為5至6月，臺南地區約為6月中旬至8月，透過栽植不同品種或產期調節，可提早或延後產期，使4至10月皆有芒果可供應市場。114年受年初低溫持續時間較長影響，開花參差、結果情形不佳且果實偏小，致產量減少；本年開花及結果情形良好，評估整體產量較


上年大幅增加。

預估115年收穫面積1萬3,697公頃，與114年1萬3,673公頃及常年平均1萬3,741公頃相當；產量16萬5,905公噸，較114年9萬2,114公噸增產80%，與常年平均12萬3,779公噸比較，亦增產34%。

**龍眼收穫面積9,980公頃，產量6萬
3,197公噸，較常年增產18%。**

► 預測月份6至7月

龍眼為亞熱帶常綠果樹，栽培品種以粉殼種為主。主產區分布於臺南、臺中及嘉義等縣市，產期集中於7至9月，可利用分區種植不同產期品種實施產期調節。龍眼適應性廣，栽培管理方式通常較其他經濟果樹粗放，果實除




可鮮食外，亦可烘培做龍眼乾及製成其他加工產品，分散市場。受農業人口老化及荔枝椿象防治不易等因素影響，部分產區有轉作及廢園情形，近5年收穫面積呈逐年下降趨勢。產量部分，相較於114年嘉義、臺南及高雄產區於採收前受丹娜絲颱風及後續豪雨影響，致產量銳減；本年多數產區開花結果情形尚可，目前為小、中果期，若後續氣候穩定，評估整體產量較上年及常年平均增加。

預估115年收穫面積9,980公頃，較114年1萬115公頃略減1%，與常年平均1萬365公頃比較，亦減少4%；產量6萬3,197公噸，較114年產量5萬2,146公噸增產21%，與常年平均5萬3,753公噸比較，亦增產18%。

文旦柚收穫面積3,649公頃，產量6萬2,036公噸，較常年減產10%。

► 預測月份6至8月

文旦柚為柑桔類果樹，主產區分布於臺南、花蓮、雲林、新北及苗栗等縣市。果實成熟期一般於農曆節氣「白露」前後，依農民留花（果）時間及種植地區不同而異，為中秋節應景果品。受農業人口老化等因素影響，部分田區廢園或轉作其他作物，近5年收穫面積呈逐年下降趨勢。產量部分，114年臺南產區受丹娜絲颱風影響，落果情形嚴重，致產量銳減；本年因災後樹勢較弱，影響開花及著果情形，評估產量較



上年增加幅度不大；另花蓮產區本年受乾旱影響，降雨不足造成著果情形不佳，評估產量較上年減少。目前正值文旦柚生理落果期，實際產量仍有待後續持續觀測。

預估115年收穫面積3,649公頃，較114年3,702公頃略減1%，與常年平均3,791公頃比較，亦減少4%；產量6萬2,036公噸，較114年5萬9,526公噸增產4%，若與常年平均6萬8,934公噸比較，則減產10%。

柿收穫面積4,473公頃，產量4萬7,803公噸，較常年減產17%。

► 預測月份7至9月

柿為溫帶落葉果樹，品種可依是否能自然脫澀分為澀柿與甜柿兩大類，臺灣主要栽培品種為澀柿的四周柿、牛心柿及甜柿的富有、次郎等。主產區為臺中、嘉義、苗栗及新竹等縣市，其中臺中市約占全臺柿種植面積70%。近年因部分農民年事漸高，廢園增加或轉作其他作物，致柿收穫面積減少；產量部分，114年多數產區於生理落果期間受颱風及雨害影響，致產量減少；本年受6月豪雨影響，落果情形增加，惟評估整體產量仍較上年增加。目前正值柿生理落果期，實際產量仍有待後續持續觀測。

預估115年收穫面積4,473公頃，較上年4,517公頃略減1%，較常年4,701公頃減少5%；產量4萬7,803公噸，較上年4萬4,344公噸增產8%，與常年平均5萬7,378公噸比較，則減產17%。

紅龍果收穫面積2,455公頃，產量5萬8,838公噸，較常年減產3%。

► 預測月份5至10月

紅龍果為多年生草本植物，主產區為南投、彰化、屏東及臺南等縣市，主要產期為6至10月。利用夜間燈照技術，部分產區可延長採收期至翌年3月或提早至5月，亦可調控留花留果數，提高果實重量及品質。紅龍果自100年起種植面積逐年大幅成長，至106年起因市場需求趨於飽和，種植面積始大致持平。產量部分，114年受丹娜絲颱風及後續豪雨影響，多數產區有不同程度淹水、落果及莖腐等災情，致產量減少；本年生產期間氣候大致穩定，目前已進入盛產期，評估整體產量較上年增加。

預估115年收穫面積2,455公頃，與114年2,462公頃相當，較常年平均2,547公頃減少4%；產量5萬8,838公噸，較114年5萬4,647公噸增產8%，若與常年平均6萬556公噸比較，則減產3%。

蔬菜類

一、葉菜類（每月預測）

甘藍收穫面積660公頃，產量3萬5,297公噸，較上月增產8%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。本月彰化及雲林等平地產

區則因氣候炎熱，目前非主要產季，收穫面積及產量較少；南投、臺中及宜蘭等高冷地為主要產區，收穫面積及產量較上月增加。

預估本月收穫面積660公頃，較上

月581公頃增加14%；產量3萬5,297公噸，較上月3萬2,586公噸增產8%，與上年同期3萬3,744公噸比較，亦增產5%。

結球白菜收穫面積41公頃，產量1,575公噸，較上月減產27%。

結球白菜性喜冷涼氣候，主產區為彰化及雲林等地。本月起氣候炎熱，較不適合結球白菜生育，主要以耐熱品種為主。今年初整體氣候較去年熱，收穫面積及產量均較上年減少。

預估本月收穫面積41公頃，較上月51公頃減少20%；產量1,575公噸，較上月2,160公噸減產27%，與上年同期1,473公噸比較，則增產7%。

青花菜收穫面積12公頃，產量210公噸，較上月減產54%；白花椰菜收穫面積62公頃，產量1,444公噸，較上月減產7%。

青花菜及白花椰菜性喜涼爽濕潤氣候，本月青花菜以雲林產區為主，氣候炎熱不適合生育，整體收穫面積及產量減少。預估本月收穫面積12公頃，較上月24公頃減少51%；產量210公噸，較上月456公噸減產54%，若與上年同期299公噸比較，亦減產30%。

本月白花椰菜主產區為彰化及高雄。預估本月收穫面積62公頃，較上月61公頃增加2%；產量1,444公噸，較上月1,553公噸減產7%，若與上年同期918公噸比較，則增產57%。

短期葉菜收穫面積590公頃，產量1萬1,256公噸，較上月減產1%。

短期葉菜包含不結球白菜及薤菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油菜及青梗白菜（青江菜）等。本月主產區為雲林及桃園，氣溫炎熱，各產區已種植夏季蔬菜為主，如薤菜、莧菜等。

預估本月收穫面積590公頃，較上月596公頃減少1%；產量1萬1,256公噸，較上月1萬1,333公噸減產1%，若與上年同期9,878公噸，則增產14%，係因上年同期受丹娜絲颱風影響。

二、瓜果類（每月預測）

胡瓜收穫面積586公頃，產量3,088公噸，較上月減產39%。

胡瓜為連續採收型作物，依果實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，主產區為屏東、高雄及彰化等地，本月為一期作與二期作生產交替期，且雲林產區已於上月採收結束，致整體收穫面積及產量較上月減少，高屏地區則開始進入二期作採收期。

預估本月收穫面積586公頃，較上月672公頃減少13%；產量3,088公噸，較上月5,047公噸減產39%，若與上年同期產量2,074公噸比較，則增產49%。

絲瓜收穫面積979公頃，產量3,694公噸，較上月減產22%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且



可連續採收。本月絲瓜主產區為臺南、南投及高雄等地，除高雄產區進入二期作採收高峰外，其餘產區為一期作與二期作生產交替期，產量較上月減少。預估本月收穫面積979公頃，較上月1,051公頃減少7%；產量3,694公噸，較上月4,723公噸減產22%，若與上年同期3,159公噸比較，則增產17%。

西瓜收穫面積876公頃，產量2萬1,236公噸，較上月減產5%。

西瓜適宜溫暖乾燥且日照充足的環境，本月主產區為宜蘭、臺中、桃園及臺南等地，花蓮產區於上月採收結束，中部產區亦為一期作採收末期，並且受到6月豪雨影響，使整體收穫面積及產量減少。

預估本月收穫面積876公頃，較上

月948公頃減少8%；產量2萬1,236公噸，較上月2萬2,332公噸減產5%，與上年同期2萬462公噸比較，則增產4%，係因上年受丹娜絲颱風影響。

三、根莖類

青蔥收穫面積327公頃，產量7,142公噸，與上月產量相當。

► 每月預測

青蔥依品種不同，對溫度感應及環境條件要求略有差異，主要栽培品種為四季蔥、粉蔥、北蔥及大蔥，主產區為彰化、雲林及宜蘭，本月一期作持續採收。

預估本月收穫面積327公頃，較上月293公頃增加12%；產量7,142公噸，較上月7,141公噸約略相當，若與上年同期7,127公噸比較亦同。

一期作薑收穫面積718公頃，總產量2萬6,689公噸，與上年產量相當。

► 預測月份3至7月

薑為宿根性多年生草本植物，食用部位為其根莖，喜溫暖氣候，主產區為南投、臺東、臺中及花蓮等地。2月起各地陸續種植，本年各產區多因異地種植、山區水源不穩及人口老化等因素影響，種植面積呈現減少趨勢。預估本年一期作收穫面積718公頃，較上年同期778公頃減少8%，與常年平均813

公頃比較，亦減少12%；產量2萬6,689公噸，較上年同期2萬6,584公噸約略相當，與常年平均2萬6,220公噸比較，則增產2%。



花卉類

菊花收穫面積39公頃，產量959萬枝，與上月產量相當。

► 每月預測

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主產區為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5至9月開花）、秋菊（10至11月開花）及寒菊（12至翌年1月開花）。近年因菊花品種權問題，適合冬季種植之品種多具品種權，加上種植技術門檻及人力不足等問題，產區漸轉種夏菊。目前進入夏菊採收期，可收穫面積略增。預估本月收穫面積39公頃，較上

月38公頃增加3%，較上年同期35公頃增加11%；預估本月產量959萬枝，與上月相當，較上年同期706萬枝增產36%，因受上年同期丹娜絲影響而相對增加。

洋桔梗收穫面積4.5公頃，產量105萬枝，較上月增產10%。

► 每月預測

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏15至25度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、雲林縣北港、虎尾、嘉義新港及臺南麻豆等鄉鎮。本月部分產區為中晚生品種收穫期，評

估產量略增。預估本月收穫面積4.5公頃，較上月4.1公頃增加8%，較上年同期3.8公頃則增加17%；預估本月產量105萬枝，較上月95萬枝增產10%，較上年同期76萬枝亦增產38%。

火鶴花收穫面積140公頃，產量269萬枝，較上月減產2%。

►每月預測

火鶴花為多年生草本花卉，主要栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。由於火鶴花喜好溫暖高濕的生長環境，臺灣氣候條件適宜，全年均可生產，且具備良好的外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5 - 6月及9 - 10月，花芽發育初期會經過一段休眠期後方能繼續生長。本月非盛產期，評估產量減少。預估本月收穫面積140

公頃，與上月面積相當，較上年同期141公頃略減1%；預估本月產量269萬枝，較上月產量275萬枝減產2%，較上年同期238萬枝則增產13%。

文心蘭收穫面積245公頃，產量400萬枝，較上月減產12%。

►每月預測

文心蘭屬多年生草本植物，主產區集中於臺中市后里、新社、北屯、石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，並具備切花外銷的發展優勢。栽培環境以網室栽培為主，每年5 - 6月及9 - 11月為盛產期，本月非盛產期。預估本月收穫面積245公頃，與上月面積相當，較上年同期253公頃減少3%；預估本月產量400萬枝，較上月產量457萬枝減產12%，較上年同期391萬枝則增產2%。🌱

