

115年8月主要農作物生產預測

撰文 | 農糧署 劉維凱、張家維

果 品 類

香蕉收穫面積1萬4,283公頃，總產量34萬2,916公噸，較常年增產8%；秋冬蕉產量15萬8,101公噸，較114年增產25%。

► 預測月份3至6月、8月至翌年1月

香蕉主要產地分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大產區，依採收季節可分為春夏蕉（2月下旬至9月中旬採收）及秋冬蕉（9月下旬至翌年2月上旬採收）。114年受丹娜絲颱風影響，

部分主產區香蕉植株倒伏，致收穫面積減少；惟颱風過後蕉價上揚，農民增加留萌情形並加強田間管理，預估115年收穫面積較上年增加。產量部分，本年南部產區受6月豪雨影響，部分田區發生淹水、葉片破損等災情，致產量減少；惟整體受災程度較114年颱風及豪雨所造成之災害輕微，若後續未再受不利氣候影響，評估整體產量較上年及常年平均增加。預估115年收穫面積1萬



4,283公頃，較114年1萬3,908公頃增加3%，若與常年平均1萬4,482公頃比較，則略減1%；產量34萬2,916公噸，較114年28萬6,140公噸增產20%，與常年平均31萬8,905公噸比較，亦增產8%。115年秋冬蕉預估收穫面積7,073公頃，與114年7,061公頃相當；產量15萬8,101公噸，較114年12萬6,072公噸，增產25%。

番荔枝收穫面積4,851公頃，總產量3萬6,149公噸，較常年增產34%；夏果產量9,903公噸，較114年增產90%。

► 預測月份6至8月、11月至翌年1月

番荔枝為熱帶常綠果樹，主產區為臺東縣，占全臺總種植面積9成以上，栽植品種主要為「釋迦」（俗稱大目釋迦）及「鳳梨釋迦」，兩者種植面積約占各半。大目釋迦透過修剪，一年可收夏果及冬果2期，夏果主產期7至10月、冬果12月至翌年4月。鳳梨釋迦在臺灣多只收冬果，透過夏季修剪及夜間燈照調整產期為12月至翌年4月，避開夏果採後裂果情形。115年番荔枝收穫面積受鳳梨釋迦廢園及轉作政策推動影響，較常年平均減少。產量部分，相較於112年至114年間，分別受海葵、康芮及楊柳颱風侵襲，造成落果、葉片受損及植株倒伏等災情，致產量明顯減少；本年目前氣候條件尚屬穩定，若後續未受不利氣候影響，評估產量較上年及常年

平均增加。預估115年收穫面積4,851公頃，與114年4,841公頃相當，較常年平均5,121公頃減少5%；產量3萬6,149公噸，較114年2萬1,690公噸增產67%，與常年平均2萬6,909公噸比較，亦增產34%。115年夏果預估收穫面積4,851公頃，與114年4,841公頃相當；產量9,903公噸，較114年5,212公噸，增產90%。

番石榴收穫面積7,904公頃，總產量19萬8,067公噸，較常年增產9%；下半年果產量10萬1,060公噸，較114年增產22%。

► 預測月份3至10月

番石榴為熱帶常綠果樹，周年可開花結實，主產區為高雄、彰化、臺南及屏東等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1至6月）及下半年果（7至12月）。番石榴利用不同修剪時期調節生產，以配合市場需求，並可避開6至9月水果盛產期及颱風豪雨季節。番石榴技術門檻較低，惟近5年，除111年生產情形較為正常外，其餘年度多受乾旱、豪雨或颱風等不利氣候因素影響，造成產量減少，致收穫面積增加幅度趨緩。產量部分，本年部分主產區受6月豪雨影響，發生田區淹水、果實擦傷及落果等災情；惟整體受災程度較上年丹娜絲颱風及後續豪雨所造成之災害為輕，若後續未再受不利氣候影響，評估整體產量仍較上年及常年平均增加。預估115年收穫面積7,904公



頃，與114年7,876公頃相當，較常年平均7,852公頃略增1%；產量19萬8,067公噸，較114年17萬1,410公噸增產16%，與常年平均18萬1,258公噸比較，亦增產9%。下半年果預估收穫面積7,904公頃，與114年7,876公頃相當；產量10萬1,060公噸，較114年8萬2,981公噸，增產22%。

木瓜收穫面積2,448公頃，產量11萬6,355公噸，較常年略增1%；夏果產量6萬7,996公噸，較114年增產10%。

► 每月預測

木瓜為熱帶果樹，主產區分布於屏東、臺南、南投及高雄等縣市，栽培品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可透過人為疏花疏果適當調節

產期，使果實於價高或病害較少的季節產出，因此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3至8月）及冬果（9月至翌年2月）。115年各主產區收穫面積較114年變動不大；產量部分，本年部分主產區受6月豪雨影響，發生淹水、水傷及落果等災情；惟整體受災程度較上年丹娜絲颱風及後續豪雨所造成之災害為輕，若後續未再受不利氣候影響，評估整體產量仍較上年增加。預估115年收穫面積2,448公頃，與114年2,449公頃相當，較常年平均2,565公頃減少5%；產量11萬6,355公噸，較114年10萬1,781公噸增產14%，與常年平均11萬5,712公噸比較，亦略增1%。夏果預估收穫面積2,448公頃，與114年2,449公頃相當；產量6萬7,996公噸，較114年6萬1,978公噸，增產10%。

文旦柚收穫面積3,649公頃，產量5萬6,441公噸，較常年減產18%。

► 預測月份6至8月

文旦柚為柑桔類果樹，主產區為臺南、花蓮、雲林、新北及苗栗等縣市。果實成熟期一般於農曆節氣「白露」前後，依農民留花（果）時間及種植地區不同而異，為中秋節應景果品。受農業人口老化等因素影響，部分田區廢園或轉作其他作物，近5年收穫面積呈逐年下降趨勢。產量部分，114年臺南產區受丹娜絲颱風影響，造成大量落果、落葉及樹體受損，致產量明顯減少；本年因樹勢尚未完全恢復，開花及著果情形不佳，評估產量與上年持平。花蓮及苗栗產區本年亦受氣候因素影響，預估產量較上年減少。其中，花蓮產區因降雨不足，導致著果情形不佳；苗栗產區則因開花期雨水不足，且小果期遭遇大雨，致生理落果情形加劇。預估115年收穫面積3,649公頃，較114年3,702公頃略減1%，與常年平均3,791公頃比較，亦減少4%；產量5萬6,441公噸，較114年5萬9,526公噸減產5%，與常年平均6萬8,934公噸比較，亦減產18%。

椪柑收穫面積4,660公頃，產量8萬6,485公噸，較常年減產12%。

► 預測月份8至9月

椪柑為亞熱帶常綠果樹，主產區為臺中、臺南及嘉義等縣市，栽培品種以高牆系為主，依採收時果皮外觀分為青



皮椪柑及橙皮柑2大類，前者多分布於雲嘉南地區，於10至11月採收，供應鮮採市場，後者則多分布於中北部地區，於11至12月採收後儲藏，供應市場至翌年4月。115年各主產區收穫面積較114年變動不大；產量方面，多數主產區本年於開花著果期受豪雨影響，結果率降低並發生落果情形；惟上年亦受低溫、雨害及颱風等不利氣候因素影響，造成開花授粉不佳、著果不良及落果情形，評估整體產量較上年增加。預估115年收穫面積4,660公頃，與114年4,654公頃相當，較常年平均4,899公頃減少5%；產量8萬6,485公噸，較114年8萬1,745公



噸增產6%，若與常年平均9萬8,614公噸比較，則減產12%。

柿收穫面積4,468公頃，產量5萬3,087公噸，較常年減產7%。

► 預測月份7至9月

柿為溫帶落葉果樹，品種可依是否能自然脫澀分為澀柿與甜柿兩大類，臺灣主要栽培品種為澀柿的四周柿、牛心柿及甜柿的富有、次郎等。主產區為臺中、嘉義、苗栗及新竹等縣市，其中臺中市約占全臺柿種植面積70%。近年因部分農民年事漸高，廢園增加或轉作其他作物，致柿收穫面積減少。產量部

分，本年臺中產區生育情形尚屬正常，評估產量較上年增加；其餘多數產區受6月強降雨及巴威颱風影響，落果情形增加，惟因上年亦受雨害及颱風影響，評估產量與上年差異不大。預估115年收穫面積4,468公頃，較上年4,517公頃略減1%，較常年平均4,701公頃減少5%；產量5萬3,087公噸，較114年4萬4,344公噸增產20%，若與常年平均5萬7,378公噸比較，則減產7%。

紅龍果收穫面積2,455公頃，產量5萬7,890公噸，較常年減產4%。

► 預測月份5至10月

紅龍果為多年生草本植物，主產區為南投、彰化、屏東及臺南等縣市，主要產期為6至10月。利用夜間燈照技術，部分產區可延長採收期至翌年3月或提早至5月，亦可調控留花留果數，提高果實重量及品質。紅龍果自100年起種植面積逐年大幅成長，至106年起因市場需求趨於飽和，種植面積始大致持平。產量部分，本年受6月豪雨影響，多數產區發生不同程度之淹水及果實水傷等災情，致產量減少；惟整體受災程度較上年受颱風及豪雨所造成之災害為輕，評估產量仍較上年增加。預估115年收穫面積2,455公頃，與114年2,462公頃相當，較常年平均2,547公頃減少4%；產量5萬7,890公噸，較114年5萬4,649公噸增產6%，若與常年平均6萬556公噸比較，則減產4%。

蔬菜類

一、葉菜類（每月預測）

甘藍收穫面積563公頃，產量3萬3,368公噸，較上月減產5%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。本月高冷地為主要產區，以宜蘭、南投及臺中為主。臺中產區一期採收結束，本月收穫面積及產量較上年同期減少。預估本月收穫面積563公頃，較上月661公頃減少15%；產量3萬3,368公噸，較上月3萬5,177公噸減產5%，與上年同期3萬3,900公噸比較，亦減產2%。

結球白菜收穫面積41公頃，產量1,552公噸，較上月略減1%。

結球白菜性喜冷涼氣候，主產區為彰化及雲林等地。本月氣候持續炎熱，主要以耐熱品種為主。預估本月收穫面積41公頃，與上月相當；產量1,552公噸，較上月1,561公噸略減1%，與上年同期1,439公噸比較，則增產8%。

青花菜收穫面積14公頃，產量272公噸，較上月增產29%；白花椰菜收穫面積55公頃，產量1,266公噸，較上月減產12%。

青花菜及白花椰菜性喜涼爽濕潤氣候，本月青花菜以雲林、彰化及高雄為主，整體收穫面積較上月略增。預估本月收穫面積14公頃，較上月12公頃增

加22%；產量272公噸，較上月210公噸增產29%，若與上年同期221公噸比較，亦增產23%，係因上年受風災影響產量較低。

本月白花椰菜主產區為彰化及高雄，氣溫炎熱，整體收穫面積及產量減少。預估本月收穫面積55公頃，較上月62公頃減少11%；產量1,266公噸，較上月1,443公噸減產12%，若與上年同期790公噸，因颱風帶來豪雨比較，則增產60%。

短期葉菜收穫面積610公頃，產量1萬1,803公噸，較上月增產11%。

短期葉菜包含不結球白菜及薺菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油菜及青梗白菜（青江菜）等。本月主產區為雲林及桃園，氣溫高，各產區種植夏季蔬菜，上月因6月下旬豪雨影響量減價揚，復耕後預期可收穫面積及產量略增。預估本月收穫面積610公頃，較上月579公頃增加5%；產量1萬1,803公噸，較上月1萬647公噸增產11%，若與上年同期1萬211公噸，亦增產16%。

二、瓜果類（每月預測）

胡瓜收穫面積652公頃，產量3,213公噸，較上月增產26%。

胡瓜為連續採收型作物，依果

實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，主產區為雲林、高雄及屏東等地，雲林產區二期作開始採收，收穫面積及產量均較上月增加。預估本月收穫面積652公頃，較上月542公頃增加20%；產量3,213公噸，較上月2,541公噸增產26%，若與上年同期產量2,564公噸比較，亦增產25%，係因上年同期受颱風、豪雨干擾所致。

絲瓜收穫面積915公頃，產量3,151公噸，較上月略增1%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且可連續採收。主產區為南投、高雄及屏東等地。屏東產區受6月下旬豪雨、南投產區受巴威颱風影響造成災損。預估本月收穫面積915公頃，較上月956公頃減少4%；產量3,151公噸，較上月3,120公噸略增1%，若與上年同期2,919公噸比較，亦增產8%。

西瓜收穫面積463公頃，產量8,678公噸，較上月增產30%。

西瓜適宜溫暖乾燥且日照充足的環境，本月主產區為花蓮、雲林及臺南。多縣市上月產出受6月大雨而減少、宜蘭產區一期作於上月結束，以及花蓮產區進入二期採收，使本月收穫面積及產量較上月增加。預估本月收穫面積463公頃，較上月417公頃增加11%；產量8,678公噸，較上月6,689



公噸增產30%，與上年同期8,584公噸比較，略增1%。

三、根莖類

青蔥收穫面積336公頃，產量7,499公噸，較上月增產7%。

► 每月預測

青蔥依品種不同，對溫度感應及環境條件要求略有差異，主要栽培品種為四季蔥、粉蔥、北蔥及大蔥，主產區為彰化、雲林及宜蘭。預估本月收穫面積336公頃，較上月327公頃增加3%；產量7,499公噸，較上月6,995公噸增產7%，若與上年同期5,306公噸比較，亦增產41%，係因上年同期丹娜絲颱風及後續豪雨造成植株泡水腐爛、倒伏或葉部折損。

花卉類

菊花收穫面積36公頃，產量784萬枝，較上月增產15%。

► 每月預測


菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主產區為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5至9月開花）、秋菊（10至11月開花）及寒菊（12至翌年1月開花）。目前為夏菊採收期。因6月豪雨影響露天植栽，使上月產量下降，預估本月起逐漸回升。預估本月收穫面積36公頃，較上月39公頃減少8%，與上年同期約略相同；預估本月產量784萬枝，較上月680萬枝增產15%，較上年同期716萬

枝增產9%。

洋桔梗收穫面積4.2公頃，產量94萬枝，較上月減產4%。

► 每月預測

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏15至25度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、雲林縣北港、虎尾、嘉義新港及臺南麻豆等鄉鎮。氣溫炎熱，為洋桔梗生長淡季。預估本月收穫面積4.2公頃，較上月4.5公頃減少5%，較上年同期3.3公頃則增加30%；預估本月產量94萬枝，較上月98萬枝減產4%，較上年同期71萬枝則增產33%，因上年同期受到丹娜絲颱風影響。



火鶴花收穫面積140公頃，產量253萬枝，較上月減產6%。

►每月預測

火鶴花為多年生草本花卉，主要栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。由於火鶴花喜好溫暖高濕的生長環境，臺灣氣候條件適宜，全年均可生產，且具備良好的外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5-6月及9-10月，花芽發育初期會經過一段休眠期後方能繼續生長。本月非盛產期，評估產量減少。預估本月收穫面積140公頃，與上月面積相當，較上年同期141公頃略減1%；預估本月產量253萬枝，較上月產量268萬枝減產6%，較上年同期205萬枝則增產24%。

文心蘭收穫面積245公頃，產量372萬枝，較上月減產7%。

►每月預測

文心蘭屬多年生草本植物，主產區集中於臺中市后里、新社、北屯、石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，並具備切花外銷的發展優勢。栽培環境以網室栽培為主，每年5-6月及9-11月為盛產期，本月非盛產期。預估本月收穫面積245公頃，與上月面積相當，較上年同期252公頃減少3%；預估本月產量372萬枝，較上月產量398萬枝減產7%，較上年同期365萬枝則增產2%。

雜糧類

二期作甘藷種植面積較常年同期增加5%。

►預測月份8、10月

臺灣地區因氣候溫暖，各地均可周年種植甘藷，栽培季節可分為裡作、一期作及二期作，主要產地以雲林、彰化、臺中、苗栗、嘉義及花蓮等縣市。其用途早期為人類的輔助食糧及家畜的混合飼料，近年則以鮮食為主，部分用於食品加工，被視為膳食纖維食品，廣

受消費者青睞。

二期作甘藷生產主要分布於雲林、彰化、臺中、新北、苗栗、花蓮等縣市。上年因丹娜絲颱風及豪雨災後種植面積增加，而本年預估二期作維持常年水準。整體預估本年二期作甘藷種植面積4,031公頃，與上年同期4,493公頃減少10%，較常年同期3,850公頃增加5%。🌱