

115年9月主要農作物生產預測

撰文 | 農糧署 劉維凱、張義鑫、張家維

果 品 類

香蕉收穫面積1萬4,284公頃，總產量33萬3,349公噸，較常年增產5%；秋冬蕉產量15萬32公噸，較114年增產19%。

► 預測月份3至6月、8月至翌年1月

香蕉主要產地分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大產區，依採收季節可分為春夏蕉（2月下旬至9月中旬採收）及秋冬蕉（9月下旬至翌年2月上旬採收）。114年受丹娜絲颱風影響，部分主產區香蕉植株倒伏，致收穫面積減少；惟風災過後蕉價上揚，農民增加留萌情形並加強田間管理，預估115年收穫面積較上年增加。產量部分，本年南部產區受6月下旬及8月下旬豪雨影響，部分蕉園浸水，造成蕉株根系受損、樹勢衰弱，甚至出現葉片枯黃等情形，進而影響蕉果生長發育，致產量減少；惟整體受災程度較114年下半年受颱風及豪雨影響，造成多數主產區受災之情形為輕。若後續未再受不利氣候影響，評估整體產量仍較上年及常年平均增加。預估115年收穫面積1萬4,284公頃，較114年1萬3,908公頃增加3%，若

與常年平均1萬4,482公頃比較，則略減1%；產量33萬3,349公噸，較114年28萬6,140公噸增產16%，與常年平均31萬8,905公噸比較，亦增產5%。115年秋冬蕉預估收穫面積7,073公頃，與114年7,061公頃相當；產量15萬32公噸，較114年12萬6,072公噸，增產19%。

番石榴收穫面積7,903公頃，總產量18萬8,195公噸，較常年增產4%；下半年果產量9萬248公噸，較114年增產9%。

► 預測月份3至10月

番石榴為熱帶常綠果樹，周年可開花結實，主產區為高雄、彰化、臺南及屏東等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1至6月）及下半年果（7至12月）。為避開6至9月水果盛產期及颱風、豪雨等天災，農民多於清明節前後進行整枝修剪，以調節番石榴產期，生產品質較佳之秋冬果。番石榴技術門檻較低，惟近5年除111年生產情形較為正常外，其餘年度多受乾旱、豪雨或颱風等不利氣候影響，致產

量減少，進而降低農民種植意願，使收穫面積增加幅度呈減緩趨勢。產量部分，本年南部產區受6月下旬及8月下旬豪雨影響，部分田區浸水，造成根系缺氧、落花及落果，致產量減少；惟整體受災程度較114年下半年颱風及豪雨造成多數主產區受災之情形為輕。若後續未再受不利氣候影響，評估整體產量仍較上年及常年平均增加。預估115年收穫面積7,903公頃，與114年7,876公頃相當，較常年平均7,852公頃略增1%；產量18萬8,195公噸，較114年17萬1,410公噸增產10%，與常年平均18萬1,258公噸比較，亦增產4%。下半年果預估收穫面積7,903公頃，與114年7,876公頃相當；產量9萬248公噸，較114年8萬2,981公噸，增產9%。

木瓜收穫面積2,448公頃，產量11萬1,785公噸，較常年減產3%；冬果產量4萬4,189公噸，較114年增產11%。

► 每月預測

木瓜為熱帶果樹，主產區分布於屏東、臺南、南投及高雄等縣市，栽培品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可透過人為疏花疏果適當調節產期，使果實於價高或病害較少的季節產出，因此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3至8月）及冬果（9月至翌年2月）。115年各主產區收穫面積較114年變動不大；產量部分，本年南

部產區受6月下旬及8月下旬豪雨影響，部分田區浸水、葉面破損及果實水傷嚴重，致產量減少；惟整體受災程度較114年下半年受颱風及豪雨影響，造成多數主產區受災之情形為輕。若後續未再受不利氣候影響，評估整體產量仍較上年增加。預估115年收穫面積2,448公頃，與114年2,449公頃相當，較常年平均2,565公頃減少5%；產量11萬1,785公噸，較114年10萬1,781公噸增產10%，若與常年平均11萬5,712公噸比較，則減產3%。冬果預估收穫面積2,448公頃，與114年2,449公頃相當；產量4萬4,189公噸，較114年3萬9,803公噸，增產11%。

檸檬收穫面積2,409公頃，產量3萬907公噸，較常年減產12%。

► 預測月份5、9月

檸檬主產區為屏東、高雄及南投等縣市，栽培品種以優利卡（Eureka）為主。檸檬具周年開花特性，全年皆可生產，主要花期為每年2至3月，盛產期集中於7至9月。隨著調製茶飲盛行，帶動檸檬需求增加，自100年起種植面積逐年擴大，至105年以後趨於穩定，惟自108年起，受人口老化等因素影響，粗放管理增加或轉作其他作物，收穫面積呈逐年下降趨勢。產量部分，本年南部產區受6月下旬及8月下旬豪雨影響，部分田區發生浸水、落花及落果等情形，致產量減少；惟

114年下半年多數主產區亦受丹娜絲颱風、楊柳颱風及豪雨等不利氣候影響，造成不同程度之災情。綜合評估，本年整體產量與上年差異不大。預估115年收穫面積2,409公頃，較114年2,378公頃略增1%，若與常年平均2,505公頃比較，則減少4%；產量3萬907公噸，較114年3萬1,104公噸略減1%，與常年平均3萬5,238公噸比較，亦減產12%。

椪柑收穫面積4,660公頃，產量8萬4,282公噸，較常年減產15%。

► 預測月份8至9月

椪柑為亞熱帶常綠果樹，主產區為臺中、臺南及嘉義等縣市，栽培品種以高牆系為主，依採收時果皮外觀分為青皮椪柑及橙皮椪柑兩大類，前者多分布於雲嘉南地區，於10至11月採收，供應鮮採市場，後者則多分布於中北部地區，於11至12月採收後儲藏，供應市場至翌年4月。115年各主產區收穫面積較114年變動不大；產量部分，本年多數主產區於開花著果期受豪雨影響，造成授粉、著果不佳及落果情形；惟上年亦受低溫、雨害及颱風等不利氣候影響，致產量減少。綜合評估，本年整體產量與上年差異不大。預估115年收穫面積4,660公頃，與114年4,654公頃相當，較常年平均4,899公頃減少5%；產量8萬4,282公噸，較114年8萬1,745公噸增產3%，若與常年平均9萬8,614公噸比較，則減產15%。

柳橙收穫面積4,519公頃，產量10萬7,190公噸，較常年減產4%。

► 預測月份9至12月

柳橙為亞熱帶常綠果樹，主產區為臺南、雲林、嘉義及南投等縣市，主產期為11月至翌年1月。柳橙1年可生長3至4次梢，適應性廣且對環境抗性強，早期栽培面積快速增加，惟近年受市場價格波動及農業人口高齡化等因素影響，粗放管理及廢園情形增加，種植面積呈漸次下降趨勢。產量部分，相較於114年下半年多數產區受丹娜絲颱風及豪雨影響，造成折枝、落果等嚴重災情；本年除於6月下旬及8月下旬受豪雨影響外，整體氣候條件相對穩定，多數產區開花及著果情形尚屬正常。綜合評估，本年整體產量較上年增加。預估115年收穫面積4,519公頃，較114年4,600公頃減少2%，與常年平均4,720公頃比較，亦減少4%；產量10萬7,190公噸，較114年9萬1,242公噸增產17%，若與常年平均11萬1,843公噸比較，則減產4%。

柿收穫面積4,468公頃，產量5萬2,242公噸，較常年減產9%。

► 預測月份7至9月

柿為溫帶落葉性喬木果樹，依果實在樹上成熟時能否自然脫澀，分為澀柿與甜柿兩大類。臺灣主要栽培品種包括澀柿之四周柿、牛心柿，以及甜柿之富有、次郎等。主產區為臺中、嘉義、苗

栗及新竹等縣市，其中以臺中市為主要產區，收穫面積占全臺7成以上。近年因部分農民年事漸高，廢園增加或轉作其他作物，致柿收穫面積減少。產量部分，本年臺中產區生育情形尚屬正常，評估產量較上年增加；其餘多數產區受豪雨等不利氣候影響，落果情形增加，惟上年亦受雨害及颱風影響，評估產量與上年差異不大。預估115年收穫面積4,468公頃，較上年4,517公頃略減1%，較常年平均4,701公頃減少5%；產量5萬2,242公噸，較114年4萬4,344公噸增產18%，若與常年平均5萬7,378公噸比較，則減產9%。

紅龍果收穫面積2,457公頃，產量5萬5,998公噸，較常年減產8%。

► 預測月份5至10月

紅龍果為多年生草本植物，主產

區為南投、彰化、屏東及臺南等縣市，主要產期為6至10月。利用夜間燈照技術，部分產區可延長採收期至翌年3月或提早至5月，亦可調控留花留果數，提高果實重量及品質。紅龍果自100年起種植面積逐年大幅成長，至106年起因市場需求趨於飽和，種植面積始大致持平。產量部分，本年多數產區受6月下旬及8月下旬豪雨影響，部分田區發生不同程度之浸水及果實水傷等災情，致產量減少；惟整體受災程度較上年受颱風及豪雨所造成之災害為輕，評估整體產量仍較上年增加。預估115年收穫面積2,457公頃，與114年2,462公頃相當，較常年平均2,547公頃減少4%；產量5萬5,998公噸，較114年5萬4,649公噸增產2%，若與常年平均6萬556公噸比較，則減產8%。

蔬菜類

一、葉菜類（每月預測）

甘藍收穫面積580公頃，產量3萬2,961公噸，較上月減產1%。

甘藍雖對溫度適應性廣，惟仍偏好溫和冷涼氣候。本月仍以高冷地為主要產區，集中於南投縣仁愛鄉、宜蘭縣大同鄉及臺中市和平區；平地產區則因夏季氣溫偏高，影響葉球生長，收穫面積與產量皆偏低。由於8月下旬豪雨未

對高冷地產區造成顯著災情，整體生育和採收情況良好，收穫面積和產量與上月基本持平。預估本月收穫面積為580公頃，較上月564公頃微增3%；產量預估為3萬2,961公噸，較上月3萬3,391公噸微減1%。另因114年同期受颱風影響，致產量基期偏低，本月預估產量與上年同期2萬5,368公噸相比，則增產30%。

結球白菜收穫面積51公頃，產量1,925公噸，較上月增產23%。

結球白菜喜好冷涼氣候，葉球發育期尤需較大日夜溫差，夏季栽培時，常因高溫影響致結球不良或葉球不緊實。本月因氣溫仍屬炎熱，產地主要分布於彰化縣和雲林縣，並以種植耐熱品種為主。在生產狀況方面，預估本月收穫面積為51公頃，較上月41公頃增加23%；產量預估為1,925公噸，較上月1,563公噸增加23%。另因114年同期受颱風影響致產量基期偏低，本月預估產量與上年同期1,627公噸相比，則增產18%。

青花菜收穫面積11公頃，產量185公噸，較上月減產32%；花椰菜收穫面積60公頃，產量1,460公噸，較上月增產15%。

青花菜與花椰菜之食用部位皆為花球，性喜涼爽濕潤氣候。花芽分化期間對溫度變化極為敏感，在夏季高溫炎熱下，花球形成不易且整齊度差，導致產量偏低，本月因氣溫仍高，尚非青花菜與花椰菜之主要產季。

青花菜產區集中於彰化縣、雲林縣及高雄市，預估本月收穫面積為11公頃，較上月14公頃減少27%；產量預估為185公噸，較上月270公噸減產32%，若與上年同期169公噸相比，則增產10%。

花椰菜主產區為彰化縣，雖然本月氣溫偏高，惟因產區目前多種植耐熱



品種，整體收穫面積與產量較上月呈現微增趨勢。預估本月收穫面積為60公頃，較上月55公頃增加10%；產量預估為1,460公噸，較上月1,267公噸增產15%。另因114年同期受颱風影響致產量基期偏低，與上年同期1,173公噸相比，則增產24%。

短期葉菜收穫面積581公頃，產量1萬1,370公噸，較上月減產3%。

短期葉菜包含不結球白菜與薺菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油菜及青梗白菜（青江菜）等，主要產區分布於雲林縣與桃園市。8月下旬豪雨對南部產區造成淹水災情，惟桃園產區未受影響，雲林產區雖未淹水，但因連續降雨及日照交替而致耗損率高，整體收穫面積與產量較上月減少。預估本月收穫面積為581公頃，較上月610公頃減少

5%；產量預估為1萬1,370公噸，較上月1萬1,763公噸微減3%；若與上年同期1萬1,199公噸相比，則增產2%。

二、瓜果類（每月預測）

胡瓜收穫面積624公頃，產量3,260公噸，較上月增產11%。

胡瓜為連續採收型作物，依果實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎周年均可生產，主產區為屏東縣、雲林縣、彰化縣及高雄市。本月進入二期作採收期，8月下旬豪雨雖對南部產區造成顯著災情，惟對中部主產區影響相對輕微，在中部產區產能釋出帶動下，整體產量較上月仍呈現增加趨勢。預估本月收穫面積為624公頃，與上月相當；產量預估為3,260公噸，較上月2,942公噸增產11%。另因114年同期受颱風影響致產量基期偏低，與上年同期2,710公噸相比，則增產20%。

絲瓜收穫面積1,008公頃，產量3,730公噸，較上月增產27%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且屬連續採收型作物。主產區集中於南投縣、臺南市、嘉義縣、屏東縣及高雄市。本月原屬二期作採收盛期，受8月下旬豪雨影響，南部主要產區遭受顯著災情，中部產區則損害相對輕微，在中部產區產能釋出帶動下，整體收穫面積與產量較上月仍呈現增加趨勢。預估本

月收穫面積為1,008公頃，較上月915公頃增加10%；產量預估為3,730公噸，較上月2,941公噸增產27%；若與上年同期3,457公噸比較，則增產8%。

西瓜收穫面積569公頃，產量1萬1,164公噸，較上月增產36%。

西瓜適宜溫暖乾燥且日照充足之環境，本月主要產區為花蓮縣，收穫面積約占全國7成。受8月下旬豪雨影響，南部產區遭受顯著災情，屏東、高雄及臺南等縣市均發生瓜田淹水情事，致中南部產區之收穫面積與產量較上月明顯減少。惟本月主產區花蓮縣進入二期作採收期，加以8月下旬豪雨未受影響，在花蓮主產區產能釋出帶動下，整體收穫面積與產量較上月仍呈現增加趨勢。預估本月收穫面積為569公頃，較上月414公頃增加38%；產量預估為1萬1,164公噸，較上月8,213公噸增產36%。另因114年同期受颱風影響，致產量基期偏低，本月預估產量與上年同期8,059公噸相比，則增產39%。

三、根莖類

青蔥收穫面積349公頃，產量7,047公噸，較上月增產6%。

► 每月預測

青蔥主要分為四季蔥與北蔥兩類，兩者對環境條件之要求不盡相同，四季蔥耐寒性佳，其中粉蔥屬於較耐熱之

類型，適合夏季栽培；北蔥則具備耐熱且耐濕特性，惟耐寒性較弱。本月主要產區集中於雲林縣與彰化縣，並以種植北蔥和粉蔥為主。8月下旬豪雨部分蔥田略有淹水受損，但因產區陸續進入採收期，加以收穫面積增加，整體產量較

上月呈現增加趨勢。預估本月收穫面積為349公頃，較上月332公頃增加5%；產量預估為7,047公噸，較上月6,667公噸增產6%，若與上年同期6,125公噸相比，則增產15%。

花卉類

菊花收穫面積38公頃，產量922萬枝，較上月增產20%。

► 每月預測

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主要產地為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5至9月開花）、秋菊（10至11月開花）及寒菊（12至翌年1月開花）。但栽培上可利用電照或黑布遮光改變日

長調節開花期，以達到周年性生產。本月為夏菊採收期。前兩月受豪雨影響使產量減少，以及8月豪雨影響供貨品質。預估本月收穫面積為38公頃，較上月35公頃增加7%，較上年同期30公頃增加27%；產量為922萬枝，與上月771萬枝相較增產20%，較上年同期742萬枝，亦增產24%。

洋桔梗收穫面積4.6公頃，產量100萬枝，較上月增產9%。

► 每月預測

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏15至25度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、雲林縣北港、虎尾、嘉義新港及臺南麻豆等地。本月非盛產期。預估本月收穫面積為4.6公頃，較上月4.2公頃增加9%，較上年同期2.8公頃增加63%；產量為100萬枝，較上月92萬枝增產9%，較上年同期69萬枝，亦增產45%。



火鶴花收穫面積140公頃，產量238萬枝，較上月減產4%。

►每月預測

火鶴花為多年生草本花卉，多栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。因火鶴花性喜溫暖高濕環境，臺灣氣候適合生長，可進行周年生產，極具外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5 - 6月及9 - 10月，花芽發育初期會經過一段休眠期再繼續發育。本月為火鶴花盛產期，但受8月下旬豪大雨影響，評估本月產量減少。預估本月收穫面積140公頃，與上月相當，較上年同期142公頃略減1%；產量238萬枝，與上月247萬枝相較減產4%，較上年同期220萬枝，則增產8%。

文心蘭收穫面積246公頃，產量390萬枝，較上月增產5%。

►每月預測

文心蘭屬多年生草本植物，主產區為臺中市后里、新社、北屯、石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，具發展切花外銷優勢。栽培環境多為網室栽培，每年5 - 6月及9 - 11月為盛產期。本月為盛產期，雖受8月下旬豪大雨影響，評估本月產量仍增加。預估本月收穫面積246公頃，與上月相當，較上年同期257公頃減少4%；產量為390萬枝，與上月372萬枝相較增產5%，較上年同期383萬枝，亦增產2%。🌱

雜糧類

二期作落花生種植面積，較上年同期作減少16%，較常年同期作亦減少23%。

►預測月份9、11月

落花生主產區為雲林、彰化及嘉義等地區，一年可種植兩期作，栽培面積常因輪作作物的選擇及前期之價格波動而有所變動。

近年落花生市場需求穩定，惟農業人口持續老化，加以二期作種植時

期易受颱風或豪雨影響，導致產量或品質減損，影響農民種植意願。經產地觀測，115年二期作受一期作收成時遇豪雨致價格偏低影響，部分農民休耕或轉作其他作物（如：甘藷、大豆、食用玉米等），評估種植面積再有減少。預估115年二期作落花生種植面積8,550公頃，較114年同期1萬197公頃減少16%，與常年同期1萬1,114公頃比較，亦減少23%。🌱