

115年10月主要農作物生產預測

撰文 | 農糧署 劉維凱、張義鑫、張家維

果 品 類

香蕉收穫面積1萬4,267公頃，產量32萬9,148公噸，較常年增產3%；秋冬蕉產量14萬6,385公噸，較114年增產16%。

► 預測月份3至6月、8月至翌年1月

香蕉主要產地分布於中南部及東部地區，以屏東縣為最大產區。依採收季節可分為春夏蕉（2月下旬至9月中旬採收）及秋冬蕉（9月下旬至翌年2月上旬採收）。114年受丹娜絲颱風影響，部分主產區香蕉植株倒伏，致收穫面積減少；惟風災過後蕉價上揚，帶動農民增加宿根留萌及新苗種植，加以本年整體氣候相對穩定，預估115年收穫面積較上年增加。產量部分，本年南部產區受6月下旬及8月下旬豪雨影響，部分蕉園浸水，造成蕉株根系受損、樹勢衰弱，部分植株並出現葉片枯黃等情形，影響蕉果生長發育；惟相較於114年下半年受颱風及豪雨影響，多數主產區均有不同程度受災情形，本年整體受災程度相對較輕。若後續未再受重大不利氣候影響，評估整體產量仍較上年增加。預估115年收穫面積1萬4,267公頃，較114年

1萬3,908公頃增加3%，若與常年平均1萬4,482公頃比較，則略減1%；產量32萬9,148公噸，較114年28萬6,140公噸增產15%，與常年平均31萬8,905公噸比較，亦增產3%。115年秋冬蕉預估收穫面積7,073公頃，與114年7,061公頃相當；產量14萬6,385公噸，較114年12萬6,072公噸，增產16%。



番石榴收穫面積7,903公頃，產量18萬4,166公噸，較常年增產2%；下半年果產量8萬8,074公噸，較114年增產6%。

► 預測月份3至10月

番石榴為熱帶常綠果樹，周年均可開花結果，主產區為高雄、彰化、臺南及屏東等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1至6月）及下半年果（7至12月）。為避開6至9月水果盛產期及颱風、豪雨等不利氣候影響，農民多於清明節前後進行整枝修剪，以調節產期，生產秋冬季品質較佳之果實。番石榴技術門檻相對較低，惟近5年除111年生產情形較為正常外，其餘年度多受乾旱、豪雨或颱風等不利氣候影響，致產量減少，進而降低農民種植意願，收穫面積增加幅度呈減緩趨勢。產量部分，本年南部產區受6月下旬及8月下旬豪雨影響，部分田區浸水，造成根系缺氧，並有落花、落果等情形，進而影響果實生長及產量；惟相較於114年下半年受颱風及豪雨影響，多數主產區均有不同程度受災情形，本年整體受災程度相對較輕。若後續未再發生不利氣候，評估整體產量仍較上年增加。預估115年收穫面積7,903公頃，與114年7,876公頃相當，較常年平均7,852公頃略增1%；產量18萬4,166公噸，較114年17萬1,410公噸增產7%，與常年平均18萬1,258公噸比較，

亦增產2%。下半年果預估收穫面積7,903公頃，與114年7,876公頃相當；產量8萬8,074公噸，較114年8萬2,981公噸，增產6%。

木瓜收穫面積2,450公頃，產量10萬8,704公噸，較常年減產6%；冬果產量4萬1,051公噸，較114年增產3%。

► 每月預測

木瓜為熱帶果樹，主產區分布於屏東、臺南、南投及高雄等縣市，栽培品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可透過人為疏花疏果適當調節產期，使果實於價高或病害較少之季節產出，因此全年均可採收，依採收季節可分為夏果（3至8月）及冬果（9月至翌年2月）。115年各主產區收穫面積較114年變動不大；產量部分，本年南部產區受6月下旬及8月下旬豪雨影響，部分田區發生浸水、葉片破損及果實水傷等情形，進而影響果實生長及產量；惟相較於114年下半年受颱風及豪雨影響，多數主產區均有不同程度受災情形，本年整體受災程度相對較輕。若後續未再受重大不利氣候影響，評估整體產量仍較上年增加。預估115年收穫面積2,450公頃，與114年2,449公頃相當，較常年平均2,565公頃減少4%；產量10萬8,704公噸，較114年10萬1,781公噸增產7%，若與常年平均11萬5,712公噸比較，則減產6%。冬果預估收穫面積

2,450公頃，與114年2,449公頃相當；產量4萬1,051公噸，較114年3萬9,803公噸，增產3%。

柳橙收穫面積4,519公頃，產量10萬2,275公噸，較常年減產9%。

► 預測月份9至12月

柳橙為亞熱帶常綠果樹，主產區為臺南、雲林、嘉義及南投等縣市，主要產期為11月至翌年1月。柳橙1年可抽生3至4次梢，適應性廣且對環境抗性強，早期栽培面積快速增加；惟近年受市場價格波動及農業人口高齡化等因素影響，粗放管理及廢園情形增加，收穫面積呈漸次下降趨勢。產量部分，相較於114年下半年多數產區受丹娜絲颱風及豪雨影響，造成折

枝、落果等較嚴重災情，本年雖亦受豪雨影響，惟整體氣候條件相對穩定，多數產區開花及結果情形尚屬正常。綜合評估，本年整體產量較上年增加。預估115年收穫面積4,519公頃，較114年4,600公頃減少2%，與常年平均4,720公頃比較，亦減少4%；產量10萬2,275公噸，較114年9萬1,242公噸增產12%，若與常年平均11萬1,843公噸比較，則減產9%。

桶柑收穫面積2,851公頃，產量4萬9,852公噸，較常年增產2%。

► 預測月份10至12月

桶柑為甜橙及寬皮柑之天然雜交種，臺灣常見品系主要有普通桶柑、大春種桶柑及海梨柑等，因多於農曆年前



後成熟上市，故又稱「年柑」。主產區分布於新竹、苗栗及臺中等地淺山丘陵地帶，主要產期為1至2月。桶柑具有隔年結果現象，可透過適當修剪及肥培管理調節樹勢，並配合疏果，以維持產量穩定。115年各主產區收穫面積較114年變動不大；產量部分，本年新竹及苗栗產區4月上旬受豪雨影響，部分田區發生浸水，6月下旬再受豪雨影響，落果情形增加；惟114年各主產區亦受雨害、颱風及高溫等不利氣候影響。綜合評估，本年整體產量與上年差異不大。預估115年收穫面積2,851公頃，較114年2,878公頃略減1%，與常年平均2,931公頃比較，亦減少3%；產量4萬9,852公噸，較114年4萬8,672公噸增產2%，與常年平均4萬8,891公噸比較，亦增產2%。

葡萄(冬果)收穫面積2,103公頃，產量1萬9,958公噸，較常年減產3%。

► 預測月份10至11月

葡萄為多年生溫帶果樹，主產區為彰化、苗栗、臺中及南投。臺灣葡萄產期調節技術發達，最普遍的栽培模式為一年二收，即6至7月生產夏果及12月至翌年1月生產冬果；另有利用溫室設施栽培生產3至5月早春葡萄，或僅生產夏果等一年一收之栽培模式。葡萄（夏果）預測範圍包含早春葡萄或夏果，葡萄（冬果）預測範圍則僅包含冬果。臺灣葡萄栽培品種以鮮食巨峰葡萄為主，



與進口葡萄具市場區隔。葡萄雖具高經濟價值，惟栽培技術門檻較高，加以農業勞動力高齡化等因素影響，廢園情形增加，近5年收穫面積呈逐年下降趨勢。產量部分，本年整體氣候相對平順，各主產區植株生育情形良好，評估整體產量較上年增加。預估115年收穫面積2,103公頃，較114年2,149公頃減少2%，與常年平均2,202公頃比較，亦減少4%；產量1萬9,958公噸，較114年1萬7,451公噸增產14%，若與常年平均2萬628公噸比較，則減產3%。

紅龍果收穫面積2,453公頃，產量5萬5,310公噸，較常年減產9%。

► 預測月份5至10月

紅龍果為多年生草本植物，主產區為南投、彰化、屏東及臺南等縣市，

主要產期為6至10月。利用夜間燈照技術，部分產區可延長採收期至翌年3月，或提早於5月採收，並可調控留花、留果數，以提高果實重量及品質。紅龍果自100年起種植面積逐年大幅成長，至106年起因市場需求趨於飽和，種植面積大致維持穩定。產量部分，本年南部產區受6月下旬及8月下旬豪雨影響，部分田區發生不同程度之浸水及果

實水傷等情形，致產量減少；惟114年亦受颱風及豪雨等不利氣候影響。綜合評估，本年整體產量與上年差異不大。預估115年收穫面積2,453公頃，與114年2,462公頃相當，較常年平均2,547公頃減少4%；產量5萬5,310公噸，較114年5萬4,649公噸略增1%，若與常年平均6萬556公噸比較，則減產9%。

蔬菜類

一、葉菜類（每月預測）

甘藍收穫面積571公頃，產量3萬1,431公噸，較上月減產7%。

甘藍雖對溫度適應性廣，惟仍偏好溫和冷涼氣候。本月仍以高冷地為主要產區，集中於南投縣、宜蘭縣及臺中市；平地產區則因夏季氣溫仍偏高，影響葉球生長，收穫面積與產量偏低。由於8月下旬豪雨未對高冷地產區造成顯著災情，整體生育和採收情況良好；然因上月菜價上揚，致部分田區提早採收完畢，使本月收穫面積和產量較上月減少；另平地甘藍於10月底開始陸續進入產期，整體供應穩定。預估本月收穫面積為571公頃，較上月607公頃減少6%；產量預估為3萬1,431公噸，較上月3萬3,958公噸減產7%，與上年同期3萬5,195公噸相比，亦減產11%。

結球白菜收穫面積73公頃，產量3,165公噸，較上月增產69%。

結球白菜喜好冷涼氣候，葉球發育期尤需較大日夜溫差，夏季栽培時，常因高溫影響致結球不良或葉球不緊實。本月隨入秋氣溫轉涼、日夜溫差漸大，氣溫環境漸趨適宜，加上9月市場價格佳及進口品食安風險帶動國產品需求，



致農民種植意願提升，整體收穫面積與產量較上月呈現增加趨勢。預估本月收穫面積為73公頃，較上月50公頃增加45%；產量預估為3,165公噸，較上月1,869公噸增加69%，與上年同期2,789公噸相比，亦增產13%。

青花菜收穫面積15公頃，產量275公噸，較上月增產48%；花椰菜收穫面積77公頃，產量1,938公噸，較上月增產36%。

青花菜與花椰菜之食用部位皆為花球，性喜涼爽濕潤氣候。花芽分化期間對溫度變化極為敏感，夏季高溫炎熱下，花球形成不易且整齊度差，導致產量偏低；本月因氣溫仍偏高，尚非青花菜與花椰菜之主要產季。

青花菜產區集中於雲林縣與彰化縣，預估本月收穫面積為15公頃，較上月11公頃增加38%；產量預估為275公噸，較上月185公噸增產48%，與上年同期223公噸相比，亦增產23%。

花椰菜主產區為彰化縣，本月氣溫雖仍偏高，惟因產區目前多種植耐熱品種，整體收穫面積與產量較上月呈現增加趨勢。預估本月收穫面積為77公頃，較上月60公頃增加28%；產量預估為1,938公噸，較上月1,422公噸增產36%。另因受8月下旬受連續豪雨影響，農民有延後種植現象，致本月產量較去年同期減少，與上年同期2,280公噸相比，亦減產15%。

短期葉菜收穫面積641公頃，產量1萬2,764公噸，較上月增產12%。

短期葉菜包含不結球白菜與薺菜，其中不結球白菜涵蓋小白菜、油菜及青梗白菜（青江菜）等，主要產區分布於雲林縣與桃園市。中南部產區受8月下旬連日豪雨影響，致上月收穫面積減少並帶動菜價上揚，農民陸續進行復耕；隨復耕作物生長順利，加上近期天候穩定，預估本月市場供應量可恢復正常，整體收穫面積與產量較上月呈現增加趨勢。預估本月收穫面積為641公頃，較上月581公頃增加10%；產量預估為1萬2,764公噸，較上月1萬1,371公噸增產12%，與上年同期1萬2,013公噸相比，亦增產6%。

二、瓜果類（每月預測）

胡瓜收穫面積592公頃，產量2,876公噸，較上月減產7%。

胡瓜為連續採收型作物，依果實外觀可分為大胡瓜及小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎周年均可生產，主產區分布於雲林縣、屏東縣、彰化縣、高雄市及南投縣等地。本月中部產區進入二期作採收末期，且南部產區受8月下旬豪雨影響後，部分復耕面積尚未達採收期，致整體產量較上月仍呈現減少趨勢。預估本月收穫面積為592公頃，較上月587公頃增加1%；產量預估為2,876公

噸，較上月3,100公噸減產7%，與上年同期2,994公噸相比，則減產4%。

絲瓜收穫面積980公頃，產量4,257公噸，較上月增產26%。

絲瓜對環境適應性強，生育期長且屬連續採收型作物。主產區集中於南投縣、臺南市、嘉義縣及高雄市等地。本月多數產區雖已進入二期作採收盛期，惟南部產區受8月下旬豪雨影響，田區積水嚴重，並出現授粉率低與落花裂果等受損現象；近期天候轉趨穩定，植株生育與授粉狀況逐漸改善，帶動單位產量回升，整體產量較上月呈現增加趨勢。預估本月收穫面積為980公頃，與上月相當；產量預估為4,257公噸，較上月3,384公噸增產26%，與上年同期4,068公噸相比，亦增產8%。

西瓜收穫面積243公頃，產量3,011公噸，較上月減產72%。

西瓜適宜溫暖乾燥且日照充足之環境，主要產區分布於臺南市、屏東縣、雲林縣及嘉義縣等縣市。上月主產區為花蓮縣，正值二期作採收盛期且未受災害影響，在產能釋出帶動下，推升上月的產量水準；本月花蓮二期作採收已告結束，採收轉集中於中南部，惟南部產區遭8月下旬連日豪雨衝擊，臺南及屏東等縣市瓜田淹水受損，致本月整體收穫面積與產量較上月明顯減少。預估本月收穫面積為243公頃，較上月

561公頃減少57%；產量預估為3,011公噸，較上月1萬0,633公噸減產72%，上年同期5,691公噸相比，亦減產47%。

三、根莖類

青蔥收穫面積404公頃，產量8,094公噸，較上月增產17%。

► 每月預測

青蔥主要分為四季蔥與北蔥兩類，兩者對環境條件之要求不盡相同，四季蔥耐寒性佳，其中粉蔥屬於較耐熱之類型，適合夏季栽培；北蔥則具備耐熱且耐濕特性，惟耐寒性較弱。本月主要產區集中於雲林縣與彰化縣，並以種植北蔥和粉蔥為主。8月下旬豪雨致部分蔥田淹水受損，惟隨著產區陸續進入採收期，加上收穫面積增加，帶動整體產量較上月呈現增加趨勢。預估本月收穫面積為404公頃，較上月346公頃增加17%；產量預估為8,094公噸，較上月6,931公噸增產17%，與上年同期7,419公噸相比，亦增產9%，係因上年受種植期多雨影響，致復耕能力受限，產量基期較低所致。



花卉類

菊花收穫面積40公頃，產量987萬枝，較上月增產9%。

► 每月預測

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主要產地為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5至9月開花）、秋菊（10至11月開花）及寒菊（12至翌年1月開花）。但栽培上可利用電照或黑布遮光改變日長調節開花期，以達到周年性生產。前月仍受前豪雨影響減少單位產量，本月預估回升。預估本月收穫面積為40公頃，較上月37公頃增加7%，較上年同期30公頃增加33%；產量為987萬枝，與上月905萬枝相較增產9%，較上年同期754萬枝，亦增產31%。

洋桔梗收穫面積4.6公頃，產量97萬枝，較上月減產2%。

► 每月預測

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏15至25度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、雲林縣北港、虎尾、嘉義新港及臺南麻豆等地。洋桔梗種植在冬季裡作，本月非盛產期。預估本月收穫面積為4.58公頃，上月4.64公頃略減1%，較上年同期3.37公頃增

加36%；產量為97萬枝，較上月99萬枝減產2%，較上年同期82萬枝，則增產18%。

火鶴花收穫面積140公頃，產量233萬枝，較上月增產6%。

► 每月預測

火鶴花為多年生草本花卉，多栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。因火鶴花性喜溫暖高濕環境，臺灣氣候適合生長，可進行周年生產，極具外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5 - 6月及9 - 10月，花芽發育初期會經過一段休眠期再繼續發育。本月為火鶴花盛產



期，評估產量增加。預估本月收穫面積140公頃，與上月相當，較上年同期142公頃略減1%；產量233萬枝，與上月221萬枝相較增產6%，較上年同期227萬枝，亦增產3%。

文心蘭收穫面積246公頃，產量395萬枝，較上月增產3%。

► 每月預測

文心蘭屬多年生草本植物，主產區為臺中市后里、新社、北屯、

石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，具發展切花外銷優勢。栽培環境多為網室栽培，每年5 - 6月及9 - 11月為盛產期。本月為盛產期，評估產量增加。預估本月收穫面積246公頃，與上月相當，較上年同期257公頃減少4%；產量為395萬枝，與上月385萬枝相較增產3%，較上年同期397萬枝，則略減1%。

雜糧類

二期作甘藷產量9萬7,911公噸，較常年同期作增產14%。

► 預測月份10月

臺灣氣候溫暖，環境條件適合甘藷生長，各地可周年種植。依栽培季節可分為裡作、一期作及二期作，主產區為雲林、彰化、臺中、臺南及新北等地。甘藷含有多種維生素及礦物質，並富含膳食纖維，早期作為輔助食糧及家畜混合飼料使用，近年則以食用或食品加工用為主要用途。

115年二期作甘藷生產仍以雲林縣生產面積最大，占臺灣地區生產面積超過五成，次為彰化、臺中、苗栗、新北及花蓮等地。上年因災後價格佳，種植意願提升，使上年二期面積與產量增

加；本期作新北地區因塊根肥大期雨水少、病蟲害，生長情形不佳，面積及產量皆較上年同期減少；臺中、彰化地區因預期花生價格低，改種植甘藷，使面積增加；苗栗產區係受景觀專區政策擴大，面積減少；雲林產區略受8月下旬豪雨影響，部分葉面枯黃、植株萎凋，另因轉作政策影響以及市場需求暢旺等，種植面積與產量相較常年同期增加。

預估115年二期作甘藷收穫面積4,368公頃，較上年同期作4,493公頃，減少3%，與常年同期作平均3,850公頃比較，則增加13%；產量9萬7,911公噸，較上年同期作10萬291公噸減產2%，與常年同期作平均8萬5,605公噸比較，則增產14%。🌱